

Läkemedel

Radium(Ra-223)diklorid Intravenös injektion

ATC-kod: V10XX03

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsvikt
Enhet för grunddos:	kBq
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

En ml lösning innehåller 1100 kBq radium-223-diklorid (Xofigo).

Administreras som långsam injektion (i allmänhet upp till 1 minut). Den intravenösa katetern eller kanylen måste spolas med isoton natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) före och efter injektion av radium-223-diklorid (Xofigo).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Får endast administreras av personer som har behörighet att hantera radiofarmaka!!

Radium-223 är en alfastrålare med en halveringstid på 11,4 dagar.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet		
Benmärgshämning förekommer, kan bli allvarlig, nadir cirka 2-3 veckor efter engångsdos, om ej återhämtat sig på 6 veckor, överväg risk/nytta, se FASS.		
Gastrointestinal påverkan		
Illamående, kräkning och diarré förekommer.		
Övrigt		
Reaktioner vid injektionsstället förekommer (rodnad, smärta, svullnad).		