

Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____

Yta (m²): _____

Vikt (kg): _____

Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Äggstockscancer

Behandlingsavsikt:

RegimID: NRB-2887

IP Cisplatin (intraperitonealt)

Indikation: Epitelial cancer C56

Ordination/Administrering

Dag	1
Cisplatin Intraperitoneal instillation 100 mg	×1

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Cisplatin späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination

Ge pre- och posthydrering med 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.

Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

- | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| 1. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
<i>Intravenös infusion - prehydrering</i> | 2 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika

_____ | | | _____ | _____ |
| 3. Cisplatin _____ mg
Ges intraperitonealt | | | _____ | _____ |
| 4. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
<i>Intravenös infusion - posthydrering</i> | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |