

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

## Antitumoral regim - Äggstockscancer

Behandlingsavsikt: Palliativ

RegimID: NRB-2794

## Docetaxel veckovis

Indikation: Epitelial cancer C56

Kurintervall: 7 dagar

## Ordination/Administrering

| Dag                                                                  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ny kur dag<br>8 |
|----------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Docetaxel (vattenfri)<br>Intravenös infusion<br>30 mg/m <sup>2</sup> | x1 |   |   |   |   |   |   |                 |

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

## Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för överkänslighetsreaktion, störst risk vid kur 2.

Kontrollera att patienten tagit sin premedicinering.

## Anvisningar för ordination

Blod- och leverstatus. För behandlingsstart neutrofila &gt;1,5 och TPK&gt;100. Kontroll av perifer neuropati.

Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason:

Behandlingsdagen tas/ges tablett Betametason 8 mg, minst en timme före behandling.

## Dosjustering rekommendation

*Hematologisk toxicitet*

Neutrofila 0,5-1,0 och/eller TPK 75-99 ge 75 % av dosen.

Neutrofila &lt; 0,5 och/eller TPK &lt;75 - behandlingen skjuts upp en vecka.

**DAG 1** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Kontrollera att patienten tagit sin premedicinering

.....

2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*

\_\_\_\_\_ .....

3. Docetaxel (vattenfri) \_\_\_\_\_ mg

30 min.

i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 30 min.

\_\_\_\_\_