

Datum: _____

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: _____

Kur nr: _____

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Längd (cm): _____

Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____

Aktuellt GFR: _____

Antitumoral barnregim - Sarkom

Behandlingsavsikt:

RegimID: NRB-12566

VC

Protokoll: iEuroEwing

Ordination/Administrering

Dag	1
Vinkristin Intravenös infusion 2 mg/m ²	x1
Mesna Intravenös infusion 500 mg/m ²	x1
Mesna Intravenös infusion 1500 mg/m ²	x1
Cyklofosfamidmonohydrat Intravenös infusion 1200 mg/m ²	x1

Medeleemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Mesna 750 mg tillsätts i 1000 ml Plasmalyte för att få Mesna 1500 mg/m² i Plasmalyte 2000 ml/m²/dygn

Anvisningar för ordination

Profylaktiskt G-CSF rekommenderas i protokollet.

Volymstegar

Plasmalyte-Mesna, Parameter: Kroppsyta (m²)

Från och med	Till (mindre än)	Grundvolym
0 m ²	2,5 m ²	2000

Beräkningsätt
kroppsyta

Enhet
ml/m ²

Infusionstid
24 tim.

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

- | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. Vinkristin _____ mg
i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 15 min.
<i>0 min. efter start av kurdag</i> | 15 min. | _____ | _____ | _____ |
| 2. Mesna _____ mg
i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 1 tim.
<i>0 min. efter stopp av rad 1, dag 1</i> | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 3. Mesna _____ mg
i Volymstege Kroppsyta _____ ml Plasmalyte
Ges intravenöst
(Tillsats: 750 mg Mesna / 1000 ml Plasmalyte)
<i>0 min. efter stopp av rad 2, dag 1</i> | 24 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 4. Cyklofosfamidmonohydrat _____ mg
i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 1 tim.
<i>0 min. efter stopp av rad 2, dag 1</i> | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |