

Antitumoral regim - Tjock- och ändtarmscancer

Behandlingsavsikt:
RegimID: NRB-1365

Aflibercept

Kurintervall: 14 dagar

Översikt

Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Aflibercept	Intravenös infusion	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion	60 min.	4 mg/kg	kroppsvikt		

Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Ny kur dag 15
1. Aflibercept Intravenös infusion 4 mg/kg	x1														

Emetogenicitet: Låg

Anvisningar för regimen

- Villkor för start av regimen**
Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inkl. kreatinin.
- Villkor och kontroller för administration**
Inför varje behandling - Blodtryck och urinsticka (proteinuri).
Urinsticka för protein (albumin):
0 till 1+: ge behandling
2 till 3+: se FASS eller lokala riktlinjer vid proteinuri

- Anvisningar för ordination**
Kontroll av blodstatus inkl neutrofila.
Uppföljning av ev. biverkningar, t.ex. blodtryck och hud.

- Antiemetika**
Förslag enligt stöddokument:
<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter=Antiemetikaregim-1-dag->

- Övrig information**
Ge alltid Aflibercept först när det ges i kombination med andra antitumorala läkemedel.
Aflibercept ska tillfälligt sättas ut minst 4 veckor före elektiv kirurgi.

Biverkningar

Aflibercept		
Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet		
Trombocytopeni med ökad blödningsrisk, i övrigt leukopeni, neutropeni, inklusive febril neutropeni.		
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
		Fortsättning på nästa sida

Aflibercept (Fortsättning)

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hypertoni Hypertoni vanligt, kan bli uttalad.		
Gastrointestinal påverkan Diarré, stomatit, nedsatt aptit, viktnedgång och buksmärta vanligt. Hemorrojder och rektal blödning förekommer. Rapporter finns om gastrointestinal perforation. Risk för fistelbildning är förhöjd (både gastrointestinallyt och icke gastrointestinallyt).		
Levertoxictet Förhöjda transaminaser vanligt.		
Njurtoxictet Proteinuri vanligt, kan bli uttalad, nefrotiskt syndrom förekommer, men ovanligt. Förhöjt kreatinin vanligt.		
CNS påverkan Huvudvärk vanligt. Fallrapporter finns om RPLS (Reversible Posterior Encephalopathy Syndrome). Diagnosticera med MR och avbryt behandlingen om verifierad RPLS.		
Hudtoxictet Hand-fot-syndromet (palmar-plantar erythrodysestesi, PPE) vanligt. Hyperpigmentering. Nedsatt sårhäkning, se FASS.		
Andningsvägar Andfåddhet, heshet vanligt.		
Tromboembolism Rapporter om både arteriell och venös tromboembolism finns, se FASS.		
Immunologisk reaktion Överkänslighetsreaktioner förekommer.		
Extravasering Grön Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		

Versionsförändringar**Version 1.2**

antiemetika

Version 1.1

lagt till patientinfo