

Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

Behandlingsavsikt: Adjuvant

RegimID: NRB-1319

Epirubicin intravesikal endosinstillation

Översikt

Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Epirubicin	Intravesikal instillation			50 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Epirubicin Intravesikal instillation 50 mg	x1

Behandlingsöversikt

Instillationsbehandlingen görs direkt efter TURB (transuretral resektion), optimalt inom 6 timmar.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

OBSERVERA att perforation i samband med TURB är en kontraindikation för tidig postoperativ instillationsbehandling.

Anvisningar för ordination

Högre dos (80 mg) har använts i randomiserade studier.

Övrig information

Se basfakta.

Biverkningar

Epirubicin

Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

Cystit

Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.

Starkt vävnadsretande

Observera att substansen är starkt vävnadsretande.

Referenser

Oddens et al. Effect of age BCG relative Epirubicin

www.regimbiblioteket.se/dokument/Oddens%20Eur%20Urol%202014.pdf