Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____

Yta (m^2): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral barnregim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-13666

ADE < 1 år eller < 10 kg (induktion kur 2)

Protokoll: CHIP-AML22
Diagnoskod: C 92

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8
Metotrexat Intratekal injektion Dosstege Ålder	x1							
Cytarabin Intravenös infusion 3,3 mg/kg (kroppsvikt)	x1	x1						
Cytarabin Intravenös infusion 3,3 mg/kg (kroppsvikt)			x2	x2	x2	x2	x2	x2
Dexrazoxan Intravenös infusion 20 mg/kg (kroppsvikt)		x1		x1		x1		
Daunorubicin Intravenös infusion 2 mg/kg (kroppsvikt)		x1		x1		x1		
Etoposidfosfat Intravenös infusion 5 mg/kg (kroppsvikt)						x1	x1	x1

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration
Blodprover vid start: Blodstatus inkl neutrofila, leverstatus, Na, K, kreatinin

Anvisningar för ordination
Tpk $\geq$ 50 inför lumbalpunktion. Annars ge trombocyttransfusion före Lp.

Ögondroppar behövs ej, då dosen Cytarabin är låg.

Dexrazoxan 500 mg/ampull
finns följande alternativ (kliniklicens)
* Cardioxane : Koncentrationen ska vara 3-10 mg/ml.
* Dexrazoxan Hikma : Koncentrationen ska vara 1,3-3 mg/ml.
* Dexrazoxan Eugia : Koncentrationen ska vara 1,3-5 mg/ml.

Dosjustering rekommendation
Vid dosreduktion av Daunorubicin bör dosen Dexrazoxan reduceras (relation Daunorubicin:Dexrazoxan = 1:10)

Dosstegar
Metotrexat it, Parameter: Ålder (år)

Från och med	Till (mindre än)	Grunddos	Beräkningssätt	Enhet
0 år	1 år	6	standarddos	mg
1 år	2 år	8	standarddos	mg
2 år	3 år	10	standarddos	mg
3 år	> år	12	standarddos	mg

DAG 1

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

		Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1.	**Metotrexat _____ mg** Ges intratekalt *(Trombocyter ska vara >50, annars ges trombocyt inf direkt före LP* *Vid CNS engagemang ges intratekal trippel istället)*		_____	_____	_____
2.	67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - ges parallellt* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt)* *0 min. efter start av kurdag*	24 tim.	_____	_____	.....
3.	**Cytarabin _____ mg** i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 24 tim. *0 tim. efter start av kurdag*	24 tim.	_____	_____	_____

DAG 2

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

		Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1.	67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - ges parallellt* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt)* *24 tim. efter start av rad 2, dag 1*	24 tim.	_____	_____	.....
2.	**Cytarabin _____ mg** i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 24 tim. *0 min. efter stopp av rad 3, dag 1*	24 tim.	_____	_____	_____
3.	**Dexrazoxan _____ mg** Ges intravenöst under 15 min. *(Går bra att ge samtidigt som Cytarabin infusion.* *VIKTIGT att Daunorubicin startas direkt efter avslutad Dexrazoxan)* *0 min. efter stopp av rad 3, dag 1*	15 min.	_____	_____	_____
4.	**Daunorubicin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *0 min. efter stopp av rad 3, dag 2*	1 tim.	_____	_____	_____

DAG 3

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *24 tim. efter start av rad 1, dag 2*	24 tim.	_____	_____	.....
2. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *0 tim. efter stopp av rad 2, dag 2*	30 min.	_____	_____	_____
3. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 2, dag 3*	30 min.	_____	_____	_____

DAG 4

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *24 tim. efter start av rad 1, dag 3*	24 tim.	_____	_____	.....
2. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 3, dag 3*	30 min.	_____	_____	_____
3. **Dexrazoxan _____ mg** Ges intravenöst under 15 min. *(VIKTIGT att Daunorubicin startas direkt efter avslutad Dexrazoxan)* *0 min. efter stopp av rad 2, dag 4*	15 min.	_____	_____	_____
4. **Daunorubicin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *0 min. efter stopp av rad 3, dag 4*	1 tim.	_____	_____	_____
5. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 2, dag 4*	30 min.	_____	_____	_____

DAG 5

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *24 tim. efter start av rad 1, dag 4*	24 tim.	_____	_____	.....
2. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 5, dag 4*	30 min.	_____	_____	_____
3. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 2, dag 5*	30 min.	_____	_____	_____

DAG 6

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *24 tim. efter start av rad 1, dag 5*	24 tim.	_____	_____	.....
2. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 3, dag 5*	30 min.	_____	_____	_____
3. **Dexrazoxan _____ mg** Ges intravenöst under 15 min. *(VIKTIGT att Daunorubicin startas direkt efter avslutad Dexrazoxan)* *0 min. efter stopp av rad 2, dag 6*	15 min.	_____	_____	_____
4. **Daunorubicin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *0 min. efter stopp av rad 3, dag 6*	1 tim.	_____	_____	_____
5. **Etoposidfosfat _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *0 min. efter stopp av rad 4, dag 6*	2 tim.	_____	_____	_____
6. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 2, dag 6*	30 min.	_____	_____	_____

DAG 7

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *24 tim. efter start av rad 1, dag 6*	24 tim.	_____	_____	.....
2. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 6, dag 6*	30 min.	_____	_____	_____
3. **Etoposidfosfat _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *0 min. efter stopp av rad 2, dag 7*	2 tim.	_____	_____	_____
4. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 2, dag 7*	30 min.	_____	_____	_____

DAG 8

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *24 tim. efter start av rad 1, dag 7*	24 tim.	_____	_____	.....
2. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 4, dag 7*	30 min.	_____	_____	_____
3. **Etoposidfosfat _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *0 min. efter stopp av rad 2, dag 8*	2 tim.	_____	_____	_____
4. **Cytarabin _____ mg** i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *12 tim. efter start av rad 2, dag 8*	30 min.	_____	_____	_____