

Datum: \_\_\_\_\_  
 Läkare: \_\_\_\_\_  
 Kur nr: \_\_\_\_\_  
 Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
 Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

## Antitumoral barnregim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-13664

### FLA < 1 år eller < 10 kg (konsolidering)

Protokoll: CHIP-AML22

Diagnoskod: C 92

## Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5
Metotrexat Intratekal injektion <a href="#">Dosstege Ålder</a>	x1				
Fludarabin Intravenös infusion 1 mg/kg (kroppsvikt)	x1	x1	x1	x1	x1
Cytarabin Intravenös infusion 67 mg/kg (kroppsvikt)	x1	x1	x1	x1	x1

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

### Villkor och kontroller för administration

Blodprover vid start: Blodstatus inkl neutrofila, leverstatus, Na, K, kreatinin

### Anvisningar för ordination

Tpk  $\geq$  50 inför lumbalpunktion. Annars ge trombocyttransfusion före Lp.

Steroidögondroppar, 1 droppe ges i vardera ögat, 3 ggr dagligen jämt fördelat över vakna delen av dygnet, fortsätter 2 dygn efter avslutad Cytarabin infusion.

### Dosstegar

Metotrexat it, Parameter: Ålder (år)

Från och med	Till (mindre än)	Grunddos	Beräkningsätt	Enhet
0 år	1 år	6	standarddos	mg
1 år	2 år	8	standarddos	mg
2 år	3 år	10	standarddos	mg
3 år	> 3 år	12	standarddos	mg

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Metotrexat \_\_\_\_\_ mg**

Ges intratekalt

(Trombocyter ska vara >50, annars ges trombocyt inf direkt före LP.

Vid CNS engagemang ges intratekal trippel istället.)

**2. 67 ml/kg = \_\_\_\_\_ ml Plasmalyte**

Intravenös infusion - hydrering

(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)

0 min. efter start av kurdag

24 tim.

**3. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin \_\_\_\_\_**

inducerad konjunktivit

**4. Fludarabin \_\_\_\_\_ mg**

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 30 min.

(Kan bli aktuellt med en mindre vätskemängd så att koncentrationen blir ok.)

0 min. efter start av kurdag

30 min.

**5. Cytarabin \_\_\_\_\_ mg**

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 3 tim.

(Cytarabin ska starta tidigast 4 timmar efter Fludarabine har avslutats)

4 tim. efter stopp av rad 4, dag 1

3 tim.

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. 67 ml/kg = \_\_\_\_\_ ml Plasmalyte**

Intravenös infusion - hydrering

(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)

24 tim. efter start av rad 2, dag 1

24 tim.

**2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin \_\_\_\_\_**

inducerad konjunktivit

**3. Fludarabin \_\_\_\_\_ mg**

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 30 min.

(Kan bli aktuellt med en mindre vätskemängd så att koncentrationen blir ok.)

0 min. efter start av rad 1, dag 2

30 min.

**4. Cytarabin \_\_\_\_\_ mg**

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 3 tim.

(Cytarabin ska starta tidigast 4 timmar efter Fludarabine har avslutats)

4 tim. efter stopp av rad 3, dag 2

3 tim.

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |         |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. 67 ml Plasmalyte<br><i>Intravenös infusion - hydrering</i><br>(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)<br>24 tim. efter start av rad 1, dag 2 | 24 tim. | _____ | _____ | ..... |
| 2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin<br>inducerad konjunktivit  |         | _____ | _____ | ..... |
| 3. <b>Fludarabin</b> _____ mg<br>i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 30 min.<br>(Kan bli aktuellt med en mindre vätskemängd så att koncentrationen blir ok.)<br>0 min. efter start av rad 1, dag 3                      | 30 min. | _____ | _____ | _____ |
| 4. <b>Cytarabin</b> _____ mg<br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 3 tim.<br>(Cytarabin ska starta tidigast 4 timmar efter Fludarabine har avslutats)<br>4 tim. efter stopp av rad 3, dag 3                           | 3 tim.  | _____ | _____ | _____ |

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |         |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte<br><i>Intravenös infusion - hydrering</i><br>(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)<br>24 tim. efter start av rad 1, dag 3 | 24 tim. | _____ | _____ | ..... |
| 2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin<br>inducerad konjunktivit  |         | _____ | _____ | ..... |
| 3. <b>Fludarabin</b> _____ mg<br>i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 30 min.<br>(Kan bli aktuellt med en mindre vätskemängd så att koncentrationen blir ok.)<br>0 min. efter start av rad 1, dag 4                                    | 30 min. | _____ | _____ | _____ |
| 4. <b>Cytarabin</b> _____ mg<br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 3 tim.<br>(Cytarabin ska starta tidigast 4 timmar efter Fludarabine har avslutats)<br>4 tim. efter stopp av rad 3, dag 4   | 3 tim.  | _____ | _____ | _____ |

**DAG 5** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |         |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|
| <p><b>1.</b> 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte<br/> <i>Intravenös infusion - hydrering</i><br/>           (= totalvätska, man kan räkna av intag som tas<br/>           per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi<br/>           och ett par timmar efter Cytarabin.)<br/>           24 tim. efter start av rad 1, dag 4</p> | 24 tim. | _____ | _____ | ..... |
| <p><b>2.</b> Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin<br/>           inducerad konjunktivit</p>  |         | _____ | ..... |       |
| <p><b>3. Fludarabin _____ mg</b><br/>           i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br/>           Ges intravenöst under 30 min.<br/>           (Kan bli aktuellt med en mindre vätskemängd så<br/>           att koncentrationen blir ok.)<br/>           0 min. efter start av rad 1, dag 5</p>                                    | 30 min. | _____ | _____ | _____ |
| <p><b>4. Cytarabin _____ mg</b><br/>           i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br/>           Ges intravenöst under 3 tim.<br/>           (Cytarabin ska starta tidigast 4 timmar efter Flu-<br/>           darabine har avslutats)<br/>           4 tim. efter stopp av rad 3, dag 5</p>                                       | 3 tim.  | _____ | _____ | _____ |