Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____

Yta (m^2): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral barnregim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-13602

HA3E > 1 år eller > 10 kg (konsolidering)

Protokoll: CHIP-AML22
Diagnoskod: C 92

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5
Metotrexat Intratekal injektion Dosstege Ålder	x1				
Cytarabin Intravenös infusion 3000 mg/m^2 (kroppsyta)	x2	x2	x2		
Etoposidfosfat Intravenös infusion 100 mg/m^2 (kroppsyta)	x1	x1	x1	x1	x1

Högemetogen.
Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration Blodprover vid start: Blodstatus inkl neutrofila, leverstatus, Na, K, kreatinin

Steroidögondroppar, 1 droppe ges i vardera ögat, 3 ggr dagligen jämt fördelat över vakna delen av dygnet, fortsätter 2 dygn efter avslutad Cytarabin infusion

Anvisningar för ordination
Tpk $\geq$ 50 inför lumbalpunktion. Annars ge trombocyttransfusion före Lp.

Dosstegar
Metotrexat it, Parameter: Ålder (år)

Från och med	Till (mindre än)	Grunddos	Beräkningssätt	Enhet
0 år	1 år	6	standarddos	mg
1 år	2 år	8	standarddos	mg
2 år	3 år	10	standarddos	mg
3 år	> år	12	standarddos	mg

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. Metotrexat _____ mg Ges intratekalt *(Trombocyter ska vara >50, annars ges trombocyt inf direkt före LP.* *Vid CNS engagemang ges intratekal trippel istället.)*		_____	_____	_____
2. 2000 ml/m^2 = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *0 min. efter start av kurdag*	24 tim.	_____	_____	.....
3. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit		_____	.....	
4. Cytarabin _____ mg i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *0 min. efter start av kurdag*	2 tim.	_____	_____	_____
5. Etoposidfosfat _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *0 min. efter stopp av rad 4, dag 1*	1 tim.	_____	_____	_____
6. Cytarabin _____ mg i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *12 tim. efter start av rad 4, dag 1*	2 tim.	_____	_____	_____

DAG 2

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

		Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1.	2000 ml/m^2 = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *24 tim. efter start av rad 2, dag 1*	24 tim.	_____	_____	.....
2.	Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit		_____	.....	
3.	**Cytarabin _____ mg** i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *12 tim. efter start av rad 6, dag 1*	2 tim.		_____	_____
4.	**Etoposidfosfat _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *0 min. efter stopp av rad 3, dag 2*	1 tim.	_____	_____	_____
5.	**Cytarabin _____ mg** i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *12 tim. efter start av rad 3, dag 2*	2 tim.	_____	_____	_____

DAG 3

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

		Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1.	2000 ml/m^2 = _____ ml Plasmalyte *Intravenös infusion - hydrering* *(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)* *24 tim. efter start av rad 1, dag 2*	24 tim.	_____	_____	.....
2.	Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit		_____	.....	
3.	**Cytarabin _____ mg** i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *12 tim. efter start av rad 5, dag 2*	2 tim.	_____	_____	_____
4.	**Etoposidfosfat _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *0 min. efter stopp av rad 3, dag 3*	1 tim.	_____	_____	_____
5.	**Cytarabin _____ mg** i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. *12 tim. efter start av rad 3, dag 3*	2 tim.	_____	_____	_____

DAG 4

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

	Inf. tid	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit, ges även 2 dygn efter Cytarabin inf		_____	.....	
2. **Etoposidfosfat _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *24 tim. efter start av rad 4, dag 3*	1 tim.	_____	_____	_____

DAG 5

Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej

	Inf. tid	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. **Etoposidfosfat _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *24 tim. efter start av rad 2, dag 4*	1 tim.	_____	_____	_____
2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit, ges även 2 dygn efter Cytarabin inf		_____	.....	