

Datum: \_\_\_\_\_  
 Läkare: \_\_\_\_\_  
 Kur nr: \_\_\_\_\_  
 Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
 Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

## Antitumoral barnregim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-13602

**HA3E > 1 år eller > 10 kg (konsolidering)**

Protokoll: CHIP-AML22

Diagnoskod: C 92

## Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5
Metotrexat Intratekal injektion Dosstege Ålder	x1				
Cytarabin Intravenös infusion 3000 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x2	x2	x2		
Etoposidfosfat Intravenös infusion 100 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1	x1	x1	x1	x1

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

### Villkor och kontroller för administration

Blodprover vid start: Blodstatus inkl neutrofila, leverstatus, Na, K, kreatinin

Steroidögondroppar, 1 droppe ges i vardera ögat, 3 ggr dagligen jämt fördelat över vakna delen av dygnet, fortsätter 2 dygn efter avslutad Cytarabin infusion

### Anvisningar för ordination

Tpk  $\geq$  50 inför lumbalpunktion. Annars ge trombocyttransfusion före Lp.

### Dosstegar

Metotrexat it, Parameter: Ålder (år)

Från och med	Till (mindre än)	Grunddos	Beräkningsätt	Enhet
0 år	1 år	6	standarddos	mg
1 år	2 år	8	standarddos	mg
2 år	3 år	10	standarddos	mg
3 år	> år	12	standarddos	mg

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Metotrexat \_\_\_\_\_ mg**

Ges intratekalt

(Trombocyter ska vara >50, annars ges trombocyt inf direkt före LP.

Vid CNS engagemang ges intratekal trippel istället.)

**2. 2000 ml/m<sup>2</sup> = \_\_\_\_\_ ml Plasmalyte**

Intravenös infusion - hydrering

(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)

0 min. efter start av kurdag

24 tim.

**3. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin \_\_\_\_\_**

inducerad konjunktivit

**4. Cytarabin \_\_\_\_\_ mg**

i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

0 min. efter start av kurdag

2 tim.

**5. Etoposidfosfat \_\_\_\_\_ mg**

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 1 tim.

0 min. efter stopp av rad 4, dag 1

1 tim.

**6. Cytarabin \_\_\_\_\_ mg**

i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

12 tim. efter start av rad 4, dag 1

2 tim.

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |         |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. 2000 ml/m <sup>2</sup> = _____ ml Plasmalyte<br><i>Intravenös infusion - hydrering</i><br>(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)<br>24 tim. efter start av rad 2, dag 1 | 24 tim. | _____ | _____ | ..... |
| 2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit  |         |       |       | ..... |
| 3. <b>Cytarabin</b> _____ mg<br>i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br>12 tim. efter start av rad 6, dag 1  | 2 tim.  |       | _____ | _____ |
| 4. <b>Etoposidfosfat</b> _____ mg<br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 1 tim.<br>0 min. efter stopp av rad 3, dag 2  | 1 tim.  | _____ | _____ | _____ |
| 5. <b>Cytarabin</b> _____ mg<br>i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br>12 tim. efter start av rad 3, dag 2  | 2 tim.  | _____ | _____ | _____ |

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |         |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. 2000 ml/m <sup>2</sup> = _____ ml Plasmalyte<br><i>Intravenös infusion - hydrering</i><br>(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)<br>24 tim. efter start av rad 1, dag 2 | 24 tim. | _____ | _____ | ..... |
| 2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit  |         |       |       | ..... |
| 3. <b>Cytarabin</b> _____ mg<br>i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br>12 tim. efter start av rad 5, dag 2  | 2 tim.  |       | _____ | _____ |
| 4. <b>Etoposidfosfat</b> _____ mg<br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 1 tim.<br>0 min. efter stopp av rad 3, dag 3  | 1 tim.  | _____ | _____ | _____ |
| 5. <b>Cytarabin</b> _____ mg<br>i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br>12 tim. efter start av rad 3, dag 3  | 2 tim.  | _____ | _____ | _____ |

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |        |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|
| 1. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin _____<br>inducerad konjunktivit, ges även 2 dygn efter Cytarabin inf      |        |       |       |       |
| 2. <b>Etoposidfosfat</b> _____ <b>mg</b><br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 1 tim.<br><i>24 tim. efter start av rad 4, dag 3</i> | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |

**DAG 5** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |        |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|
| 1. <b>Etoposidfosfat</b> _____ <b>mg</b><br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 1 tim.<br><i>24 tim. efter start av rad 2, dag 4</i> | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin _____<br>inducerad konjunktivit, ges även 2 dygn efter Cytarabin inf      |        |       |       |       |