

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____
 Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral barnregim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-13662

HA3E < 1 år eller < 10 kg (konsolidering)

Protokoll: CHIP-AML22

Diagnoskod: C 92

Ordination/Administrering

| Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|----|----|----|----|
| Metotrexat Intratekal injektion Dosstege Ålder | x1 | | | | |
| Cytarabin Intravenös infusion 100 mg/kg (kroppsvikt) | x2 | x2 | x2 | | |
| Etoposidfosfat Intravenös infusion 3,3 mg/kg (kroppsvikt) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Blodprover vid start: Blodstatus inkl neutrofila, leverstatus, Na, K, kreatinin

Anvisningar för ordination

Tpk \geq 50 inför lumbalpunktion. Annars ge trombocyttransfusion före Lp.

Steroidögondroppar, 1 droppe ges i vardera ögat, 3 ggr dagligen jämt fördelat över vakna delen av dygnet, fortsätter 2 dygn efter avslutad Cytarabin infusion

Dosstegar

Metotrexat it, Parameter: Ålder (år)

| Från och med | Till (mindre än) | Grunddos | Beräkningsätt | Enhet |
|--------------|------------------|----------|---------------|-------|
| 0 år | 1 år | 6 | standarddos | mg |
| 1 år | 2 år | 8 | standarddos | mg |
| 2 år | 3 år | 10 | standarddos | mg |
| 3 år | > år | 12 | standarddos | mg |

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Metotrexat _____ mg

Ges intratekalt

(Trombocyter ska vara >50, annars ges trombocyt inf direkt före LP.

Vid CNS engagemang ges intratekal trippel istället.)

2. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte

Intravenös infusion - hydrering

(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)

0 min. efter start av kurdag

24 tim.

3. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin _____

inducerad konjunktivit

4. Cytarabin _____ mg

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

0 min. efter start av kurdag

2 tim.

5. Etoposidfosfat _____ mg

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 1 tim.

0 min. efter stopp av rad 4, dag 1

1 tim.

6. Cytarabin _____ mg

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

12 tim. efter start av rad 4, dag 1

2 tim.

DAG 2 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte <i>Intravenös infusion - hydrering</i> (= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.) 24 tim. efter start av rad 2, dag 1 | 24 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit | | _____ | _____ | _____ |
| 3. Cytarabin _____ mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. 12 tim. efter start av rad 6, dag 1 | 2 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 4. Etoposidfosfat _____ mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. 0 min. efter stopp av rad 3, dag 2 | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 5. Cytarabin _____ mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. 12 tim. efter start av rad 3, dag 2 | 2 tim. | _____ | _____ | _____ |

DAG 3 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte <i>Intravenös infusion - hydrering</i> (= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.) 24 tim. efter start av rad 1, dag 2 | 24 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin inducerad konjunktivit | | _____ | _____ | _____ |
| 3. Cytarabin _____ mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. 12 tim. efter start av rad 5, dag 2 | 2 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 4. Etoposidfosfat _____ mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. 0 min. efter stopp av rad 3, dag 3 | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 5. Cytarabin _____ mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. 12 tim. efter start av rad 3, dag 3 | 2 tim. | _____ | _____ | _____ |

DAG 4 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| 1. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin _____ inducerad konjunktivit, ges även 2 dygn efter Cytarabin inf | | | | |
| 2. Etoposidfosfat _____ mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. <i>24 tim. efter start av rad 4, dag 3</i> | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |

DAG 5 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| 1. Etoposidfosfat _____ mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. <i>24 tim. efter start av rad 2, dag 4</i> | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förebygger cytarabin _____ inducerad konjunktivit, ges även 2 dygn efter Cytarabin inf | | | | |