

Datum: _____
Läkare: _____
Kur nr: _____
Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____
Yta (m²): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral barnregim - Akut myeloisk
 leukemi (AML)

RegimID: NRB-13661

HAM < 1 år eller < 10 kg (konsolidering)

Protokoll: CHIP-AML22

Diagnoskod: C 92

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5
Metotrexat Intratekal injektion Dosstege Ålder	x1				
Cytarabin Intravenös infusion 33 mg/kg (kroppsvikt)	x2	x2	x2		
Dexrazoxan Intravenös infusion 16,7 mg/m ² (kroppsyta)			x1	x1	x1
Mitoxantron Intravenös infusion 0,33 mg/kg (kroppsvikt)			x1	x1	x1

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Blodprover vid start: Blodstatus inkl neutrofila, leverstatus, Na, K, kreatinin

Anvisningar för ordinationTpk \geq 50 inför lumbalpunktion. Annars ge trombocyttransfusion före Lp.

Steroidögonddroppar, 1 droppe ges i vardera ögat, 3 ggr dagligen jämt fördelat över vakna delen av dygnet, fortsätter 2 dygn efter avslutad Cytarabin infusion.

Dexrazoxan 500 mg/ampull

finns följande alternativ (kliniklicens)

- * Cardioxane : Koncentrationen ska vara 3-10 mg/ml.
- * Dexrazoxan Hikma : Koncentrationen ska vara 1,3-3 mg/ml.
- * Dexrazoxan Eugia : Koncentrationen ska vara 1,3-5 mg/ml.

Dosjustering rekommendation

Vid dosreduktion av Mitoxantron bör dosen Dexrazoxan reduceras (relation Mitoxantron : Dexrazoxan = 1:50)

Dosstegar**Metotrexat it**, Parameter: Ålder (år)

Från och med	Till (mindre än)	Grunddos	Beräkningsätt	Enhet
0 år	1 år	6	standarddos	mg
1 år	2 år	8	standarddos	mg
2 år	3 år	10	standarddos	mg
3 år	> år	12	standarddos	mg

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Metotrexat _____ mg

Ges intratekalt

*(Trombocyter ska vara >50, annars ges trombocyt inf direkt före LP)**Vid CNS engagemang ges intratekal trippel istället)***2. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte***Intravenös infusion - hydrering**(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)**0 min. efter start av kurdag***3. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin _____**

inducerad konjunktivit

4. Cytarabin _____ mg

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

*0 min. efter start av kurdag***5. Cytarabin _____ mg**

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

12 tim. efter start av rad 4, dag 1

DAG 2 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte*Intravenös infusion - hydrering**(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och ett par timmar efter Cytarabin.)**24 tim. efter start av rad 2, dag 1***2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin _____**

inducerad konjunktivit

3. Cytarabin _____ mg

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

*12 tim. efter start av rad 5, dag 1***4. Cytarabin _____ mg**

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

12 tim. efter start av rad 3, dag 2

DAG 3 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| <p>1. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte
 <i>Intravenös infusion - hydrering</i>
 (= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi.)
 24 tim. efter start av rad 1, dag 2</p> | 24 tim. | _____ | _____ | |
| <p>2. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin _____
 inducerad konjunktivit</p> | | | | |
| <p>3. Cytarabin _____ mg
 i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Ges intravenöst under 2 tim.
 12 tim. efter start av rad 4, dag 2</p> | 2 tim. | _____ | _____ | _____ |
| <p>4. Dexrazoxan _____ mg
 Ges intravenöst under 15 min.
 (VIKTIGT att Mitoxantron startas direkt efter avslutad Dexrazoxan)
 0 min. efter stopp av rad 3, dag 3</p> | 15 min. | _____ | _____ | _____ |
| <p>5. Mitoxantron _____ mg
 i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Ges intravenöst under 1 tim.
 (Kan bli aktuellt med en mindre vätskemängd så att koncentrationen blir ok.)
 0 min. efter stopp av rad 4, dag 3</p> | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |
| <p>6. Cytarabin _____ mg
 i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Ges intravenöst under 2 tim.
 12 tim. efter start av rad 3, dag 3</p> | 2 tim. | _____ | _____ | _____ |

DAG 4 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin _____ inducerad konjunktivit, även detta dygn som är dygnet efter given Cytarabin, kan förlängas några dagar vb. | | | | |
| 2. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte
<i>Intravenös infusion - hydrering</i>
(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och kan avslutas 2 timmar efter avslutad Mitoxantron inf.)
24 tim. efter start av rad 1, dag 3 | 24 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 3. Dexrazoxan _____ mg
Ges intravenöst under 15 min.
(VIKTIGT att Mitoxantron startas direkt efter avslutad Dexrazoxan)
24 tim. efter start av rad 4, dag 3 | 15 min. | _____ | _____ | _____ |
| 4. Mitoxantron _____ mg
i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 1 tim.
(Kan bli aktuellt med en mindre vätskemängd så att koncentrationen blir ok.)
0 min. efter stopp av rad 3, dag 4 | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |

DAG 5 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 1. Kortison ögondroppar, 1 dr i vardera öga 3-4 ggr/dygn, förbygger cytarabin _____ inducerad konjunktivit, även detta dygn som är 2:a dygnet efter given Cytarabin, kan förlängas några dagar vb. | | | | |
| 2. 67 ml/kg = _____ ml Plasmalyte
<i>Intravenös infusion - hydrering</i>
(= totalvätska, man kan räkna av intag som tas per oralt. Vätska ges i samband med kemoterapi och kan avslutas 2 timmar efter avslutad Mitoxantron inf.)
24 tim. efter start av rad 2, dag 4 | 24 tim. | _____ | _____ | _____ |
| 3. Dexrazoxan _____ mg
Ges intravenöst under 15 min.
(VIKTIGT att Mitoxantron startas direkt efter avslutad Dexrazoxan)
24 tim. efter start av rad 3, dag 4 | 15 min. | _____ | _____ | _____ |
| 4. Mitoxantron _____ mg
i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 1 tim.
(Kan bli aktuellt med en mindre vätskemängd så att koncentrationen blir ok.)
0 min. efter stopp av rad 3, dag 5 | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |