Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____

Yta (m^2): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral barnregim - Sarkom

RegimID: NRB-12683

AP + Dexrazoxan

Protokoll: EURAMOS
Diagnoskod: C 40, C 41

Ordination/Administrering

Dag	1	2
Dexrazoxan Intravenös infusion 375 mg/m^2 (kroppsyta)	x1	x1
Doxorubicin Intravenös infusion 37,5 mg/m^2 (kroppsyta)	x1	x1
Cisplatin Intravenös infusion 60 mg/m^2 (kroppsyta)	x1	x1

Högemetogen.
Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration Om urinproduktion $<$ 600 ml/m^2/6 timmar så ges Furosemid 10 mg/ml 1-2 ml iv

Anvisningar för ordination
Dexrazoxan 500 mg/ampull

finns följande alternativ (kliniklicens)

* Cardioxane : Koncentrationen ska vara 3-10 mg/ml.
* Dexrazoxan Hikma : Koncentrationen ska vara 1,3-3 mg/ml.
* Dexrazoxan Eugia : Koncentrationen ska vara 1,3-5 mg/ml.

Dosjustering rekommendation
Vid dosreduktion av Doxorubicin bör dosen Dexrazoxan reduceras (relation Doxorubicin:Dexrazoxan = 1:10)

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. 750 ml/m^2 = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad *Intravenös infusion - prehydrering* *(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)* *0 min. efter start av kurdag*	6 tim.	_____	_____	.....
2. **Dexrazoxan _____ mg** Ges intravenöst under 15 min. *(Ges direkt före Doxorubicin inf)* *4 tim. 45 min. efter start av rad 1, dag 1*	15 min.	_____	_____	_____
3. **Doxorubicin _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *0 min. efter stopp av rad 2, dag 1*	1 tim.	_____	_____	_____
4. 500 ml/m^2 = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad *Intravenös infusion - ges parallellt* *(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 100 ml Mannitol + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)* *0 min. efter stopp av rad 1, dag 1*	4 tim.	_____	_____	.....
5. **Cisplatin _____ mg** i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 4 tim. *0 min. efter stopp av rad 3, dag 1*	4 tim.	_____	_____	_____
6. 2500 ml/m^2 = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad *Intravenös infusion - hydrering* *(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)* *0 min. efter stopp av rad 4, dag 1*	20 tim.	_____	_____	.....

DAG 2 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. Dexrazoxan _____ mg Ges intravenöst under 15 min. *(Ges direkt före Doxorubicin inf)* *24 tim. efter start av rad 2, dag 1*	15 min.	_____	_____	_____
2. Doxorubicin _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. *0 min. efter stopp av rad 1, dag 2*	1 tim.	_____	_____	_____
3. 500 ml/m^2 = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad *Intravenös infusion - ges parallellt* *(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 100 ml Mannitol + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)* *0 min. efter stopp av rad 6, dag 1*	4 tim.	_____	_____	.....
4. Cisplatin _____ mg i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 4 tim. *0 min. efter start av rad 3, dag 2*	4 tim.	_____	_____	_____
5. 3000 ml/m^2 = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad *Intravenös infusion - posthydrering* *(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)* *0 min. efter stopp av rad 3, dag 2*	24 tim.	_____	_____	.....