**Datum:** _____

**Läkare:** _____

**Kur nr:** _____

**Längd (cm):** _____ **Vikt (kg):** _____

**Yta ($m^2$):** _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral barnregim - Sarkom

RegimID: NRB-12683

# AP + Dexrazoxan

Protokoll: EURAMOS
Diagnoskod: C 40, C 41

## Ordination/Administrering

| Dag | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Dexrazoxan<br>Intravenös infusion<br>375 mg/$m^2$ (kroppsyta) | x1 | x1 |
| Doxorubicin<br>Intravenös infusion<br>37,5 mg/$m^2$ (kroppsyta) | x1 | x1 |
| Cisplatin<br>Intravenös infusion<br>60 mg/$m^2$ (kroppsyta) | x1 | x1 |

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

**Villkor och kontroller för administration**

Om urinproduktion $<$ 600 ml/$m^2$/6 timmar så ges Furosemid 10 mg/ml 1-2 ml iv

**Anvisningar för ordination**

Dexrazoxan 500 mg/ampull

finns följande alternativ (kliniklicens)

* Cardioxane : Koncentrationen ska vara 3-10 mg/ml.
* Dexrazoxan Hikma : Koncentrationen ska vara 1,3-3 mg/ml.
* Dexrazoxan Eugia : Koncentrationen ska vara 1,3-5 mg/ml.

**Dosjustering rekommendation**

Vid dosreduktion av Doxorubicin bör dosen Dexrazoxan reduceras (relation Doxorubicin:Dexrazoxan = 1:10)

| **DAG 1** Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej | **Inf. tid** | **Klockan** | **Ssk. sign** | **Läk. sign** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** 750 ml/m$^2$ = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad<br>*Intravenös infusion - prehydrering*<br>*(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)*<br>*0 min. efter start av kurdag* | 6 tim. | _____ | _____ | ..... |
| **2.** **Dexrazoxan _____ mg**<br>Ges intravenöst under 15 min.<br>*(Ges direkt före Doxorubicin inf)*<br>*4 tim. 45 min. efter start av rad 1, dag 1* | 15 min. | _____ | _____ | _____ |
| **3.** **Doxorubicin _____ mg**<br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 1 tim.<br>*0 min. efter stopp av rad 2, dag 1* | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |
| **4.** 500 ml/m$^2$ = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad<br>*Intravenös infusion - ges parallellt*<br>*(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 100 ml Mannitol + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)*<br>*0 min. efter stopp av rad 1, dag 1* | 4 tim. | _____ | _____ | ..... |
| **5.** **Cisplatin _____ mg**<br>i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 4 tim.<br>*0 min. efter stopp av rad 3, dag 1* | 4 tim. | _____ | _____ | _____ |
| **6.** 2500 ml/m$^2$ = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad<br>*Intravenös infusion - hydrering*<br>*(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)*<br>*0 min. efter stopp av rad 4, dag 1* | 20 tim. | _____ | _____ | ..... |

| **DAG 2** Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej | **Inf. tid** | **Klockan** | **Ssk. sign** | **Läk. sign** |
|---|---|---|---|---|
| **1. Dexrazoxan _____ mg**<br>Ges intravenöst under 15 min.<br>*(Ges direkt före Doxorubicin inf)*<br>*24 tim. efter start av rad 2, dag 1* | 15 min. | _____ | _____ | _____ |
| **2. Doxorubicin _____ mg**<br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 1 tim.<br>*0 min. efter stopp av rad 1, dag 2* | 1 tim. | _____ | _____ | _____ |
| **3.** 500 ml/$m^2$ = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad<br>*Intravenös infusion - ges parallellt*<br>*(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 100 ml Mannitol + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)*<br>*0 min. efter stopp av rad 6, dag 1* | 4 tim. | _____ | _____ | ..... |
| **4. Cisplatin _____ mg**<br>i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 4 tim.<br>*0 min. efter start av rad 3, dag 2* | 4 tim. | _____ | _____ | _____ |
| **5.** 3000 ml/$m^2$ = _____ ml Glukos 25mg/ml buffrad<br>*Intravenös infusion - posthydrering*<br>*(Tillsatser: 20 mmol KCl + 5 mmol Mg + 10 ml Calciumgluconat B.Braun 10% / liter Glucos 25 mg/ml Buffrad)*<br>*0 min. efter stopp av rad 3, dag 2* | 24 tim. | _____ | _____ | ..... |