

Datum: _____

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: _____

Kur nr: _____

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Längd (cm): _____

Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____

Aktuellt GFR: _____

Antitumoral barnregim - Sarkom

Behandlingsavsikt:

VC

RegimID: NRB-12566

Protokoll: iEuroEwing

Ordination/Administrering

Dag	1
Vinkristin Intravenös infusion 2 mg/m ²	x1
Mesna Intravenös infusion 500 mg/m ²	x1
Mesna Intravenös infusion 1500 mg/m ²	x1
Cyklofosfamidmonohydrat Intravenös infusion 1200 mg/m ²	x1

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administrationMesna 750 mg tillsätts i 1000 ml Plasmalyte för att få Mesna 1500 mg/m² i Plasmalyte 2000 ml/m²/dygn**Anvisningar för ordination**

Profylaktiskt G-CSF rekommenderas i protokollet.

VolymstegarPlasmalyte-Mesna, Parameter: Kroppsyta (m²)

Från och med	Till (mindre än)	Grundvolym
0 m ²	2,5 m ²	2000

Beräkningssätt
kroppsyta

Enhet
ml/m ²

Infusionstid
24 tim.

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Vinkristin _____ mg

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 15 min.

0 min. efter start av kurdag

15 min.

2. Mesna _____ mg

i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 1 tim.

0 min. efter stopp av rad 1, dag 1

1 tim.

3. Mesna _____ mg

i [Volymstege Kroppsyta](#) _____ ml Plasmalyte

Ges intravenöst

(Tillsats: 750 mg Mesna / 1000 ml Plasmalyte)

0 min. efter stopp av rad 2, dag 1

4. Cyklofosfamidmonohydrat _____ mg

i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 1 tim.

0 min. efter stopp av rad 2, dag 1

1 tim.