VDC+Dexrazoxan

vid iEuroEwing

Schema för regimen

Ny kur dag 15

Dag	1	2
Vinkristin	X	
Mesna	X	
Mesna	X	
Dexrazoxan	X	X
Doxorubicin	X	X
Cyklofosfamidmono-hydrat	X	

Om din behandling

Vinkristin, doxorubicin och cyklofosfamid är cytostatika som du kommer att få som dropp. Du kommer att få rikligt med vätskedropp och ett läkemedel som heter Mesna för att din kropp ska må bra.

Dexrazoxan ges för att förebygga framtida risk för hjärtpåverkan.

Behandlingen pågår i 2 dygn. Denna kur ges växelvis med IE kuren, behandlingsstart cirka var 14:e dag.

Cytostatika påverkar de vita blodkropparna, alltså de celler i kroppen som försvarar kroppen mot infektioner. Det kan göra att immunförsvaret försvagas. De bakterier som orsakar infektioner är i första hand egna bakterier som du själv har i munnen, på huden eller i tarmen. Genom att ta temperatur och vara uppmärksam på feber kan man upptäcka en infektion.

Vid cytostatikabehandling är det vanligt att bli extra trött. Det är inte farligt, men att röra på sig kan hjälpa.

Under behandlingen följs dina blodprover och eventuellt biverkningar.

Kontakta genast din klinik vid:

- Om du har 38 grader eller mer i feber vid två tillfällen med en timme emellan
- Om du har 38,5 grader eller mer vid ett tillfälle
- Om du känner dig sjuk, har ett påverkat allmäntillstånd.
- Om du får ont utan att du vet varför. Ta inte smärtstillande innan du pratat med vården. Då är det svårare att ta reda på varför du har ont.

.....

Allmän information om läkemedel som ingår i behandlingen

Vinkristin

Läkemedlet hämmar tillväxt av cancercellerna genom att påverka deras förmåga att dela sig. Vinkristin ges som ett dropp.

Biverkningar du kan få

- Magknip och/eller förstoppning.
- Smärta i ben, käke, muskler och/eller ryggen.
- Man kan också få svårigheter att gå, men det är viktigt att gå så mycket som möjligt.
- Hängande ögonlock eller skelning förekommer.

Förebyggande medicin mot förstoppning kan behövas.

Biverkningarna går i de flesta fall över, men kan bli långvariga.

Doxorubicin

Doxorubicin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa, kräkas och bli lös i magen.
- Du kan få blåsor och sår i munnen.
- Du kan tappa håret. Det kommer oftast tillbaka efter behandlingen. Ditt nya hår kan vara annorlunda, till exempel ha en annan färg eller vara lockigt om det tidigare var rakt.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Du får medicin mot illamående

Innan du får droppet får du medicin mot illamående.

Kisset kan bli rött

Medicinen är röd, och därför kan kisset bli rött. Det försvinner cirka ett dygn efter att du har fått sista dosen av medicinen.

Hjärtat undersöks med ultraljud

Medicinen kan påverka hjärtat. Därför undersöks ditt hjärta med ultraljud före, under och efter behandlingen.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocyttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.

Dexrazoxan

Beskrivning

Dexrazoxan är ett cytostatika, som ges tillsammans med Doxorubicin för att minska risken för framtida hjärtsjukdom.

Dexrazoxan ges som ett dropp (infusion) i din/ditt barns venport eller CVK under 15 minuter.

Vilka biverkningar kan medicinen ha?

Dexrazoxan kan ge trötthet, infektionskänslighet och hudutslag.

Cyklofosfamid

Läkemedlet hämmar tillväxt av cancercellerna genom att påverka deras förmåga att dela sig. Behandlingen ges som ett dropp

Biverkningar

- Illamående och kräkning,
- Håravfall
- Blod i urinen.
- Läkemedlet påverkar bildningen av röda och vita blodkroppar samt blodplättar så att dessa nivåer blir låga. Detta kontrolleras med blodprover.

Annan viktig information

Cyklofosfamid kan påverka slemhinnan i urinblåsan. För att skydda slemhinnan ges läkemedlet Mesna och extra vätska tillsammans med behandlingen. Urinen kontrolleras med urinsticka för att upptäcka och vid behov åtgärda uppkommen irritation i urinblåsans slemhinna.

Mesna

Mesna ges för att skydda urinblåsan vid behandling med cyklofosfamid eller ifosfamid.

Mesna kan ges som dropp eller spruta

Biverkningar som du kan få

- Hudutslag och klåda.
- Ont i magen, illamående och diarre.
- Huvudvärk och svimningskänsla.