

Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____

Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____

Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral barnregim - Sarkom

VDC+Dexrazoxan

Protokoll: iEuroEwing

Behandlingsavsikt:

RegimID: NRB-12564

Ordnation/Administrering

Dag	1	2
Vinkristin Intravenös infusion 2 mg/m ²	x1	
Mesna Intravenös injektion 500 mg/m ²	x1	
Mesna Intravenös infusion 1500 mg/m ²	x1	
Cardioxane (Dexrazoxan mot hjärttoxicitet) Intravenös infusion 375 mg/m ²	x1	x1
Doxorubicin Intravenös infusion 37,5 mg/m ²	x1	x1
Cyklofosfamidmonohydrat Intravenös infusion 1200 mg/m ²	x1	

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Mesna 750 mg tillsätts i 1000 ml Plasmalyte för att få Mesna 1500 mg/m² i Plasmalyte 2000 ml/m²/dygn

Anvisningar för ordination

Dexrazoxan 500 mg/ampull

finns följande alternativ (kliniklicens)

- * Cardioxane : Koncentrationen ska vara 3-10 mg/ml.
- * Dexrazoxan Hikma : Koncentrationen ska vara 1,3-3 mg/ml.
- * Dexrazoxan Eugia : Koncentrationen ska vara 1,3-5 mg/ml.

Profylaktiskt G-CSF rekommenderas i protokollet.

Dosjustering rekommendation

Vid dosreduktion av Doxorubicin bör dosen Dexrazoxan reduceras (relation Doxorubicin:Dexrazoxan = 1:10)

Volymstegar**Plasmalyte-Mesna**, Parameter: Kroppsyta (m2)**Från och med Till (mindre än) Grundvolym**

0 m2

2,5 m2

2000

Beräkningssätt

kroppsyta

Enhetml/m²**Infusionstid**

24 tim.

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Vinkristin _____ mg**

15 min.

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 15 min.

0 min. efter start av kurdag

2. Mesna _____ mg

3 min.

Ges intravenöst under 3 min.

0 min. efter stopp av rad 1, dag 1

3. Mesna _____ mgi **Volymstege Kroppsyta** _____ ml Plasmalyte

Ges intravenöst

(Tillsats: 750 mg Mesna / 1000 ml Plasmalyte)

0 min. efter stopp av rad 2, dag 1

4. Cardioxane (Dexrazoxan mot hjärttoxicitet) _____ mg

15 min.

i 100 ml Ringer-laktat

Ges intravenöst under 15 min.

(Ges direkt före Doxorubicin)

0 min. efter start av rad 3, dag 1

5. Doxorubicin _____ mg

1 tim.

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 1 tim.

0 min. efter stopp av rad 4, dag 1

6. Cyklofosfamidmonohydrat _____ mg

1 tim.

i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 1 tim.

0 min. efter stopp av rad 5, dag 1

DAG 2 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Cardioxane (Dexrazoxan mot hjärttoxicitet) _____ mg**

15 min.

i 100 ml Ringer-laktat

Ges intravenöst under 15 min.

24 tim. efter start av rad 4, dag 1

2. Doxorubicin _____ mg

1 tim.

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 1 tim.

0 min. efter stopp av rad 1, dag 2