

## Antitumoralt läkemedel

**Abemaciclib Peroral tablett**

ATC-kod: L01EF03

**BASFakta****Doseringsaspekter**

<b>Beräkningsätt:</b>	Standarddos
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg
<b>Administreringsväg:</b>	Peroral
<b>Dosering i förh. måltid:</b>	Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

**Anvisningar****Anvisningar för läkemedelsadministration**

Grapefrukt och grapefruktjuice bör undvikas. Vid kräkning eller missad dos tas nästa dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle.

**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

**Biverkningar**

<b>Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
<b>Hematologisk toxicitet</b> Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
<b>Infektionsrisk</b> Infektioner vanliga, oftast grad 1-2.		
<b>Tromboembolism</b> Ökad tromboembolirisk förekommer vid samtidig behandling med fulvestrant eller aromatashämmare. Utred vid tecken eller symtom på tromboembolism.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Diarré mycket vanligt. Patienter bör vara instruerade att starta behandling mot diarré (t ex loperamid) vid första tecknet på lös avföring, öka sitt vätskeintag och meddela sin vårdande enhet. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS. Nedsatt aptit, kräkningar och illamående vanligt. Förändrad smakupplevelse förekommer.		
<b>Levertoxicitet</b> Förhöjning av ALAT, ASAT är vanligt, oftast grad 1-2, men kan nå grad 3-4. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.	Leverfunktion	
<b>Hudtoxicitet</b> Alopeci (håravfall) förekommer. Klåda, utslag och torr hud förekommer, oftast milda.		
<b>Övrigt</b> Utmattning (fatigue) vanligt. Yrsel och muskelsvaghet förekommer. Ökat tårflöde förekommer.		
<b>Njurtoxicitet</b> Kreatinin ökning vanligt, enligt FASS räknas ej som toxicitet, då det visat sig bero på hämning av de transportproteiner som medverkar i den tubulära sekretionen i njurarna utan att inverka på den glomerulära funktionen (uppmätt som iohexol-clearance).	Njurfunktion	

Fortsättning på nästa sida

<b>Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
<b>Interaktionsbenägen substans</b> Samtidig användning av starka CYP3A4-hämmare med abemaciclib ska undvikas, då samtidig användning kan öka effekten av abemaciclib. (Exempel på starka CYP3A4-hämmare: klaritromycin, itraconazol, ketokonazol, lopinavir/titonavir, posakonazole eller vorikonazol. Undvik även grapefrukt och grapefruktjuice.) Samtidig användning av starka CYP3A4-inducerare ska undvikas, då samtidig användning kan minska effekten av abemaciclib. (Exempel på starka CYP3A4-inducerare: karbamazepin, fenytoin, rifampicin och johannesört.)		

## Versionsförändringar

### Version 1.2

ATC kod justerad, kontroller tillagda.

### Version 1.1

Handhavande information

### Version 1.0

Basfaktan fastställdes.