

# Antitumoralt läkemedel

## Abirateron Per oral tablett

Basfakta

### Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Standarddos
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg
<b>Administreringsväg:</b>	Per oral
<b>Dosering i förh. måltid:</b>	Tas på fastande mage

### Anvisningar

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tas minst två timmar efter matintag och ingen mat får ätas under minst en timme efter att tablettorna har tagits.

Preparat med Johannesört ska undvikas. Vid missad dos, ta din vanliga dos nästa dag.

### Biverkningar

<b>Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
<b>Hjärttoxicitet</b> Perifera ödem vanligt. Före behandlingsstart bör hjärtsvikt behandlas och hjärtfunktion eventuellt undersökas, efter behandlingsstart uppmärksammas nytillkomna symtom på hjärtsvikt, rytmrubbning och kärlkramp. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.		
<b>Hypertoni</b> Hypertoni vanligt. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.	Blodtryck	
<b>Endokrinologi</b> Hypokalemi vanligt, kan bli uttalad. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.		
<b>Infektionsrisk</b> Urinvägsinfektion vanligt.		
<b>Levertoxicitet</b> Förhöjda levervärden vanligt, kan kräva dosminskning, uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Diarré vanligt.		
<b>Interaktionsbenägen substans</b> Abirateron metaboliseras via CYP3A4 och därför skall samtidigt intag av kraftiga inducerare av CYP3A4 undvikas (till exempel fenytoin, karbamazepin, rifampicin, rifabutin, rifapentin, fenobarbital, johannesört [ <i>Hypericum perforatum</i> ]). Se FASS. Abirateron påverkar CYP2D6 varför försiktighet ska iakttagas med samtidigt intag av läkemedel som aktiveras av eller metaboliseras av CYP2D6. (Till exempel metoprolol, propranolol, desipramin, venlafaxin, haloperidol, risperidon, propafenon, flekainid, kodein, oxykodon och tramadol). Se FASS. Försiktighet bör iakttagas vid samtidigt intag av läkemedel som har känd risk för QT förlängning eller är kända som arytmi-benägna, se FASS. Samtidig användning av spironolakton rekommenderas ej, se FASS.		