Antitumoralt läkemedel

# Amsakrin Intravenös infusion

ATC-kod: L01XX01

Basfakta

## Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Kroppsyta
**Enhet för grunddos:** $mg/m^2$
**Administreringsväg:** Intravenös

## Anvisningar

**Anvisningar för läkemedelsadministration**
Spoldropp Glukos 50 mg/mL används, inkompatibelt med Natriumklorid.

**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**
**Handhavande**

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

## Spädningsinformation

**Spädningsvätska**
500 ml Glukos 50 mg/ml

**Spädningsanvisningar**
Steg 1: 1,5 ml av amsakrinlösningen (I) överförs till bipackad injektionsflaska med mjölsyra (II) och omskakas försiktigt tills en klar lösning fås. Stamlösningens koncentration är 5 mg/mL.

Steg 2: Ordinerad dos sätts till infusionspåsen med Glukos 50 mg/ml och blandas försiktigt. Plastspruta av märket ONCE används.

Inkompatibelt med Natriumklorid-lösningar. Hållbarhet enligt FASS.

**Hållbarhet efter spädning**
48 timmar

**Förvaring**
Rumstemperatur

## Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---|---|
| **Hematologisk toxicitet** | Blodvärden | Enligt lokala riktlinjer |
| Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos. | | |
| **Hjärttoxicitet** | Elektrolyter | |
| Risk för arytmier (förmaksflimmer, sinustakykardi, ventrikelflimmer). Risken för arytmi ökar vid hypokalemi och hypomagnesemi. Kalium och magnesium ska kontrolleras före och under behandling. | | |
| **Tumörlyssyndrom** | Urat | Hydrering<br>Allopurinol |
| Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller. Ge Allopurinol 300 mg peroralt, dagligen under behandlingsperioden.<br>Vid behov kan rasurbikas (Fasturtec) ges. | | |
| **Gastrointestinal påverkan** | Biverkningskontroll | |
| Illamående, kräkning, diarré, buksmärta, stomatit vanligt. | | |
| **Starkt vävnadsretande** | | |
| Nekros och sårbildning vid extravasering. Endast intravenös administrering. | | |

Fortsättning på nästa sida

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---|---|
| **Extravasering**<br>**Röd** | | Kyla<br>DMSO |
| Vävnadstoxisk - risk för nekros (hög risk för vävnadsskada).<br>Räknas till "DNA-bindande" (Irritant with vesicant-like properties).<br>Central infart bör användas.<br>Följ instruktion för kylbehandling, se stöddokument Extravasering.<br>Överväg behandling med DMSO. | | |

# Versionsförändringar

**Version 1.6**
Textkorr.

**Version 1.5**
extravaseringsrubrik

**Version 1.4**
Hänvisning handhavnade

**Version 1.3**
Anvisningar för läkemedelsadministration - lagt till: inkompatibelt med Natriumklorid.

**Version 1.2**
Text Hållbarhet har uppdaterats.

**Version 1.1**
Hållbarheten har ökats till 48 timmar, enligt FASS. Spoldropp Glukos 50 mg/mL används.

**Version 1.0**
Basfaktan fastställdes.