

Läkemedel

Anastrozol Per oral tablett

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Per oral
Dosering i förh. måltid:	Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Glömd dos - ta inte dubbel dos (två doser på en gång) för att kompensera för en glömd dos.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CNS påverkan		
Huvudvärk vanligt. Trötthet/fatigue (asteni) förekommer. Parestesi och smakförändringar har rapporterats. Karpaltunnelsyndrom beskrivet som ökad risk, dock hos personer med riskfaktorer för karpaltunnelsyndrom i övrigt.		
Gastrointestinal påverkan		
Illamående vanligt. Kräkningar och diarré förekommer.		
Övrigt		
Värmevallningar vanliga.		
Hudtoxicitet		
Hudutslag vanligt. Håravfall förekommer.		
Övrigt		
Ledvärk och ledstelhet vanligt. Skelettsmärta och muskelvärk förekommer. Minskad nivå på cirkulerande östrogen kan medföra risk för minskad bentäthet. Osteoporos förekommer.		
Endokrinologi		
Hyperkolesterolemi förekommer.		
Levertoxicitet		
Förhöjda levervärden förekommer.		
Övrigt		
Vaginal torrhet och vaginal blödning förekommer.		
Interaktionsbenägen substans		
Undvik samtidig administration av Tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar då detta kan minska effekten av anastrozol.		