Läkemedel

Anastrozol Peroral tablett

ATC-kod: L02BG03

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral
Dosering i förh. måltid:	Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Glömd dos - ta inte dubbel dos (två doser på en gång) för att kompensera för en glömd dos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande:

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner ihttps://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CNS påverkan Huvudvärk vanligt. Trötthet/fatigue (asteni) förekommer. Nedstämdhet förekommer. Parestesi och smakförändringar har rapporterats. Karpaltunnelsyndrom beskrivet som ökad risk, dock hos personer med riskfaktorer för karpaltunnelsyndrom i övrigt.		
Gastrointestinal påverkan Illamående vanligt. Kräkningar och diarré förekommer.		
Övrigt Värmevallningar vanliga.		
Hudtoxicitet Hudutslag vanligt. Håravfall förekommer.		
Övrigt Ledvärk och ledstelhet vanligt. Skelettsmärta och muskelvärk förekommer. Minskad nivå på cirkulerande östrogen kan medföra risk för minskad bentäthet. Osteoporos förekommer.		
Endokrinologi Hyperkolesterolemi förekommer.		
Levertoxicitet Förhöjda levervärden förekommer.		
Övrigt Vaginal torrhet och vaginal blödning förekommer.		
Interaktionsbenägen substans Undvik samtidig administration av Tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar då detta kan minska effekten av anastrozol.		

Versionsförändringar

Version 1.4
Lagt till hänvisning handhavande.

Version 1.3
nedstämdhet flyttat till CNS påverkan

Version 1.2
justerad text med tillagd nedstämdhet

Version 1.1
Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.