

Antitumoralt läkemedel

Bexaroten Peroral kapsel

ATC-kod: L01XF03

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Peroral
Dosering i förh. måltid:	Tas i samband med måltid

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i

<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödande behandling
Levertoxicitet Kontrollera blodlipider (triglycerider och kolesterol) på fastande mage innan behandlingsstart och varje vecka tills lipidsvaret på bexaroten har fastställts.	Leverfunktion Lipidnivåerna kontrolleras därefter månadsvis.	
Endokrinologi Reversibel minskning av sköldkörtel- och tyroideastimulerande hormon.	Tyroidea	Kontrollera före start och därefter månadsvis.

Versionsförändringar

Version 1.1

Lagt till hänvisning handhavande.

Version 1.0

BASFaktan fastställdes.