

Antitumoralt läkemedel

Bortezomib Subkutan injektion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Subkutan

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Bortezomib 3,5 mg löses upp med 1,4 ml
Natriumklorid 9 mg/ml, ger koncentrationen 2,5 mg/ml.

Förvaras mörkt.

Hållbarhet efter spädning
8 dygn

Förvaring
Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan Illamående, diarré, kräkningar och förstoppning är vanliga biverkningar.		
Neuropati Perifer neuropati förekommer, mestadels sensorisk, men rapporter om motorisk påverkan finns.	Biverkningskontroll	
Hypotension Ortostatisk hypotension förekommer, ett fåtal av dessa inkluderar svimningsepisoder. Se över blodtrycksmedicinering i övrigt, hydrerings situation och eventuellt behov av mer specifik behandling.	Blodtryck	
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer