Antitumoralt läkemedel

Bortezomib Subkutan injektion

ATC-kod: L01XG01

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m^2
Administreringsväg: Subkutan

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
pH i bruksfärdig lösning anges till 4-7.

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar
Bortezomib 3,5 mg löses upp med 1,4 ml Natriumklorid 9 mg/ml, ger koncentrationen 2,5 mg/ml. Förvaras i skydd för ljus.

Ett flertal företag tillhandahåller Bortezomib. Längst hållbarhet anger STADA med "28 dagar vid 2 - 8 °C skyddad från ljus, 7 dagar vid 25 °C skyddad från ljus eller 24 timmar vid 25 °C i vanlig inomhusbelysning vid förvaring i originalflaskan och/eller i en polypropeninjektionsspruta.", se FASS.

Hållbarhet efter spädning
8 dygn

Förvaring
Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.		
Gastrointestinal påverkan		
Illamående, diarré, kräkningar och förstoppning är vanliga biverkningar.		
Neuropati	Biverkningskontroll	
Perifer neuropati förekommer, mestadels sensorisk, men rapporter om motorisk påverkan finns.		
Hypotension	Blodtryck	
Ortostatisk hypotension förekommer, ett fåtal av dessa inkluderar svimningsepisoder. Se över blodtrycksmedicinering i övrigt, hydrerings situation och eventuellt behov av mer specifik behandling.		

Versionsförändringar

Version 1.5
justerad arkiverad ATC, ordning och ogiltigt tecken.

Version 1.4
Handhavande information tillagd.

Version 1.3
Redigerat under spädning.

Version 1.2
Text Hållbarhet har uppdaterats.

Version 1.1
lagt till filnamn vid export av filer

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.