

Antitumoralt läkemedel

Busulfan Peroral tablett

ATC-kod: L01AB01

BASFakta**Doseringsaspekter**

Beräkningssätt: Kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Peroral

Anvisningar**Anvisningar för läkemedelsadministration**

Hela dagsdosen kan tas som en engångsdos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner
<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---|-----------------------------|
| CNS påverkan Vid höga doser bör krampprofylax ges. | Monitorering Bensodiazepiner är att föredra före fenytoin. | Antiepileptika |
| Tumörlyssyndrom Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges. | Urat | Allopurinol Hydrering |
| Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. | Blodvärden | Enligt lokala riktlinjer |

Versionsförändringar**Version 1.1**

Handhavande information tillagd.

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.