Antitumoralt läkemedel

Busulfan Peroral tablett

ATC-kod: L01AB01

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Peroral

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Hela dagsdosen kan tas som en engångsdos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner ihttps://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CNS påverkan	Monitorering	Antiepileptika
Vid höga doser bör krampprofylax ges. Bensodiazepiner är att föredra före fenytoin.		
Tumörlyssyndrom		Allopurinol
	Urat	Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.		
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		

Versionsförändringar

Version 1.1
Handhavande information tillagd.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.