

Antitumoralt läkemedel

Cetuximab Intravenös infusion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

För initialdosen rekommenderas en infusionstid på 120 minuter. För påföljande doser är den rekommenderade infusionstiden 60 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Hållbarhet efter spädning
48 timmar

Förvaring
Rumstemperatur

Spädningsanvisningar

Tag infusionspåse av passande storlek med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml. Beräkna erforderlig volym cetuximab. Töm ut motsvarande volym av natriumkloridlösningen från infusionspåsen och sätt till önskad volym av cetuximab.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi	Monitorering	Akutberedskap Antihistamin Kortikosteroid
Hudtoxicitet	Biverkningskontroll	Infektionsbehandling/profylax Kortikosteroid Mjukgörande hudkräm
Aceliknande dermatit, klåda, torr hud och nagelbesvär mycket vanligt. Profylaktisk användning av perorala tetracykliner (6-8 veckor) och topikal applicering av fuktgivande 1 % hydrokortisonkräm bör övervägas, se FASS.		
Gastrointestinal påverkan Diarré, illamående och kräkning vanligt.		
Elektrolytrubbning	Elektrolyter	
Gradvis sjunkande magnesiumhalter i serum förekommer ofta och kan leda till allvarlig hypomagnesemi som är reversibel efter utsättande.		
Ögonpåverkan	Biverkningskontroll	
Vid tecken på keratit skall ögonläkare konsulteras. Behandling kan behöva avbrytas. Försiktighet hos patienter med anamnes på keratit, ulcerös keratit eller mycket torra ögon.		