

Antitumoralt läkemedel

Cisplatin Intraperitoneal instillation

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intraperitoneal

Spädningsinformation

Spädningsvätska
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiella kumulativ nefrototoxicitet.		
Övrigt Allergisk reaktion ovanlig vid engångsbehandling intraperitonealt. Kan uppstå vid upprepade behandlingar.		
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Neuropati Neuropati förekommer.		
Gastrointestinal påverkan Buksmärta som lokal reaktion. Illamående, kräkningar förekommer. Peritonit omnämns.		
Njurtoxicitet Njurtoxicitet även vid intraperitoneal instillation. Hydreringsbehov föreligger.	Njurfunktion	Hydrering
Interaktionsbenägen substans Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.		