

## Antitumoralt läkemedel

## Cisplatin Intraperitoneal instillation

ATC-kod: L01XA01

BASFakta

## Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intraperitoneal

## Anvisningar

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner

i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Spädningsinformation

## Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>CAVE aminoglykosider</b> Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling.		Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
<b>Övrigt</b> Allergisk reaktion ovanlig vid engångsbehandling intraperitonealt. Kan uppstå vid upprepade behandlingar.		
<b>Hematologisk toxicitet</b> Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
<b>Neuropati</b> Neuropati förekommer.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Buksmärta som lokal reaktion. Illamående, kräkningar förekommer. Peritonit omnämns.		
<b>Njurtoxicitet</b> Njurtoxicitet även vid intraperitoneal instillation. Hydreringsbehov föreligger.	Njurfunktion	Hydrering
<b>Interaktionsbenägen substans</b> Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.		

## Versionsförändringar

## Version 1.4

Handhavande information tillagd.

## Version 1.3

Lagt till en referens

## Version 1.2

Ändrat till standarddos och mg från kroppsytta och mg/m<sup>2</sup>

## Version 1.0

BASFakta fastställdes.