

## Antitumoralt läkemedel

# Cytarabin Liposomalt Intratekal injektion

ATC-kod: L01BC01

## Basfakta

### Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intratekal

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som långsam injektion på 1-5 minuter direkt i cerebrospinalvätskan.

Får endast administreras intratekalt.

### Spädningsinformation

#### Spädningsanvisningar

Flaskan värms till rumstemperatur i minst 30 minuter och vänds försiktigt upp och ned för att återsuspendera partiklarna precis innan ordinerad dos dras upp i spruta. Undvik kraftig omskakning!

**Hållbarhet efter spädning**  
24 timmar

**Förvaring**  
Kallt

### Biverkningar

<u>Observandum</u>	<u>Kontroll</u>	<u>Stödjande behandling</u>
<b>CNS påverkan</b>		Kortikosteroid
Alla patienter ska ges dexametason 4 mg två gånger dagligen oralt eller intravenöst under fem dagar med start dagen för behandling med cytarabin intratekalt. Alternativt ges behandling med betametason.		

### Versionsförändringar

#### Version 1.0

Arkiveras - läkemedel DepoCyte avregistrerat. (arkiverad)