

Antitumoralt läkemedel

Cytarabin Intratekal injektion

ATC-kod: L01BC01

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intratekal

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering enligt ålder vara aktuell.

Konsultera alltid respektive protokoll.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Styrkan 20 mg/ml användes.

Hållbarhet efter spädning
24 timmarFörvaring
Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CNS påverkan Araknoidit är ett syndrom som visar sig huvudsakligen i form av illamående, kräkningar, huvudvärk och feber. Betametason bör användas.		Kortikosteroid

Versionsförändringar

Version 1.5

Handhavande information tillagd.

Version 1.4

granskad för barn, barnspec kommentar

Version 1.3

granskningstext används för barn

Version 1.2

används för barn

Version 1.1

granskad för barnprojektet

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.