

Antitumoralt läkemedel

Cytarabin Intravenös injektion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

Spädningsanvisningar

Både 20 och 100 mg/ml kan ges intravenöst.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Tumörlyssyndrom Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller. Eventuellt profylax med Allopurinol. Eventuellt behov av Rasburikas (Fasturtec).		
Ögonpåverkan Hemorragisk konjunktivit vanligt, behandling med kortisoninnehållande ögondroppar kan förebygga eller minska symtomen.		
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Gastrointestinal påverkan Inflammation av slemhinnan förekommer, exempelvis munsår / stomatit och diarré.		
Immunologisk reaktion Cytarabin syndrom förekommer (skelettsmärta, bröstsmärta, konjunktivit, feber, utslag, kroppsligt obehag, muskelsmärta). Kan eventuellt förebyggas eller minskas av kortikosteroider.		