

## Antitumoralt läkemedel

## Daratumumab Subkutan injektion

ATC-kod: L01FC01

## Basfakta

## Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Subkutan

## Anvisningar

## Anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras i den subkutana vävnaden i buken cirka 7,5 cm till höger eller vänster om naveln under cirka 3-5 minuter.

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

## Handhavande:

Okonjugerad monoklonal antikropp, läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Spädningsinformation

## Spädningsanvisningar

Hållbarheten är 24 timmar PLUS 12 timmar i rumstemperatur, enligt FASS. Vid beredning, dvs uppdragning i spruta, under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Längre hållbarhet har rapporterats av Knoll et al, se referens. De anger en hållbarhet på minst 28 dagar vid förvaring kallt eller i rumstemperatur i skydd för ljus.

Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning  
36 timmar

Förvaring  
Kallt

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>	Blodtryck Puls	Akutberedskap
Infusionsreaktioner vanligast vid första injektionen, oftast grad 1-2. Upprepad infusionsreaktion förekommer. Pre-medicineringsbehov för att minska risk. Om grad 4 (anafylaktisk eller livshotande) reaktion avslutas behandlingen.		
<b>Hematologisk toxicitet</b>	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.		
<b>Infektionsrisk</b>		
Infektionsrisk ökad. Övre luftvägsinfektion och lunginflammation vanligast. Herpes Zoster Virus reaktivering förekommer. Hepatit B reaktivering har rapporterats.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar vanligt.		

Fortsättning på nästa sida

<b>Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
<b>Hjärttoxicitet</b> Hypertoni och förmaksflimmer förekommer.	EKG	
<b>Andningsvägar</b> Hosta och andnöd vanligt.		
<b>Smärta</b> Smärtor i rygg, leder och extremiteter förekommer. Även muskulära bröstsmärtor förekommer.		
<b>Övrigt</b> Feber och fatigue (utmattning) vanligt. Perifera ödem förekommer. Erytem eller annan reaktion vid injektionsställe förekommer.		
<b>Övrigt</b> Daratumab är en human IgG kappa monoclonal antikropp, detta kan ge inverkan på elfores och bedömning av respons hos vissa patienter med IgG kappa myelom.		

## Versionsförändringar

### Version 1.4

Lagt till handhavandeinfo.

### Version 1.3

ATC arkiverad utbytt, kontroll tillagd till observandumrubriker.

### Version 1.2

Hållbarhet i uppdragen spruta har angetts. Referens har lagts till.

### Version 1.1

Granskad efter fastställd.

### Version 1.0

Basfaktan fastställdes.