

Antitumoralt läkemedel

Dasatinib (vattenfri) Peroral tablett

ATC-kod: L01EA02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral
Dosering i förh. måltid:	Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missats tas nästa dos på den vanliga tiden.

Tabletterna ska sväljas hela och inte krossas eller delas.

Grapefrukt/grapefruktjuice eller johannesört får ej intas under behandlingen. Även Omeprazol och andra protonpumpshämmare bör undvikas.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**Handhavande**

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i

<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos. Anemi, neutropeni och trombocytopeni mycket vanligt, oftast reversibelt. Eventuellt uppehåll eller dosreducering, se FASS. Blödningshändelser finns rapporterade till förekommande, framförallt förknippat med trombocytopeni grad 3-4.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Infektionsrisk Infektionsrisk ökad. Pneumoni, övre luftvägsinfektion, enterokolit omnämns. Hepatit B-virus reaktivering har rapporterats.	Biverkningskontroll	
Hjärttoxicitet Hjärtsvikt, perikardutgjutning, rytmstörningar förekommer. Förlängning av QT intervall har rapporterats, försiktighet vid ökad risk sedan tidigare, så som elektrolytrubbningar, medfödda ökade risker för QT förlängning eller andra läkemedel med ökad risk för QT förlängning, se FASS. Hjärtinfarkt har rapporterats.	EKG Hjärtfunktion	
Vätskeretention Vätskeretention vanligt, pleurautgjutning, ascites, lungödem och perikardiell utgjutning omnämns, liksom perifera ödem. Ökad risk hos äldre patienter.	Biverkningskontroll	
Andningsvägar Pleurautgjutning vanligt. Andfåddhet vanligt. Hosta, pneumonit förekommer. Rapporter om PAH (pulmonell arteriell hypertension) finns, kan uppstå lång tid efter behandlingsstart.	Biverkningskontroll	
Gastrointestinal påverkan Diarré vanligt, illamående, kräkningar, buksmärta förekommer. Gastrointestinal blödning förekommer. Mukosit/stomatit förekommer. Dyspepsi och förstoppning förekommer. Pankreatit finns rapporterat.	Biverkningskontroll	

Fortsättning på nästa sida

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hudtoxicitet Hudutslag vanligt. Håravfall, dermatit, klåda, torr hud, urtikaria och svettningar förekommer. Hudsår, fotosensibilisering och nagelsjukdomar har rapporterats. Svåra hudreaktioner har rapporterats, så som Stevens-Johnson syndrome.	Biverkningskontroll	
CNS påverkan Huvudvärk vanligt. Neuropati förekommer. Yrsel, smakförändringar och somnolens förekommer. Tremor, balansubbnings har rapporterats. Hjärninfarkt, TIA, krampanfall och optikusneurit har rapporterats enstaka fall.		
Övrigt Muskuloskeletal smärta vanlig. Ledsmärta, myalgi, muskelsvaghet förekommer. Synrubbingar förekommer. Tinnitus förekommer.		
Interaktionsbenägen substans Dasatinib är substrat för och hämmare av CYP3A4. Samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare med Dasatinib rekommenderas inte, då det kan öka exponering för Dasatinib och därmed öka toxicitet. (Exempel på starka CYP3A4-hämmare är: ketokonazol, itrakonazol, erytromycin, klaritromycin, ritonavir, telitromycin och grapefruktjuice.) Samtidig administrering av CYP3A4-inducerare med dasatinib rekommenderas inte, då det kan kraftigt minska exponeringen för Dasatinib med risk för terapivikt. (Exempel på CYP3A4-inducerare är: dexametason, fenytoin, karbamazepin, rifampicin, fenobarbital och <i>Hypericum perforatum</i> (Johannesört).) Samtidig administrering av ett CYP3A4-substrat med Dasatinib kan öka exponeringen för CYP3A4-substratet och bör ske med försiktighet, framför allt om CYP3A4-substratet har smalt terapeutiskt intervall. (Exempel på CYP3A4-substrat med smalt terapeutiskt intervall är: astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil och ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin).) Samtidig administrering av en histamin-2 (H2)-antagonist (t. ex. famotidin), protonpumpshämmare (t. ex. omeprazol) eller aluminiumhydroxid/magnesiumhydroxid med Dasatinib rekommenderas inte då det kan minska exponeringen för Dasatinib. Medel innehållande aluminiumhydroxid/magnesiumhydroxid bör ges minst 2 timmar före eller 2 timmar efter administrering av Dasatinib. Se FASS.		

Versionsförändringar

Version 1.7

ytterligare justerad text.

Version 1.6

Justerade biverkningstexter.

Version 1.5

justeringar

Version 1.4

Uppdateringar under anvisningar för läkemedelsadministration.

Version 1.3

Ändrat i handhavande skyddsutrustnings information.

Version 1.2

Handhavande information tillagd.

Version 1.1

Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.