

Antitumoralt läkemedel

Decitabin Intravenös infusion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Koncentrationsintervall: 0,1-1,0 mg/ml

Spädningsanvisningar
Decitabin 50 mg torrs substans löses med 10 ml Sterilt vatten för injektion, ger lösning med styrkan 5 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning
4 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)

Förvaring
Kallt

Ordinerad dos sätts till KALL infusionsvätska.

Förvaring kallt i upp till 3 timmar kan följas av upp till 1 timme vid rumstemperatur före administrering.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet		
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, så följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
Infektionsrisk		
Infektionsrisk ökad.		
Gastrointestinal påverkan		
Diarré, kräkningar och illamående vanligt. Enterokolit inklusive neutropen kolit finns rapporterat.		
Slemhinnetoxicitet		
Stomatit vanligt		
CNS påverkan		
Huvudvärk vanligt.		
Övrigt		
Näsblödning vanligt.		