

# Antitumoralt läkemedel

## Degarelix Subkutan injektion

BASFakta

### Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Subkutan

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som en subkutan injektion i bukområdet. Injektionsstället bör varieras periodiskt. Injektionerna bör ges i områden där patienten inte exponeras för tryck, t ex inte i närheten av byxlinning eller bälte och inte nära revbenen. Se hanterings- och beredningsinstruktioner i FASS för respektive förpackning.

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Övrigt</b> Värmevallningar vanliga. Minskad libido (sexuell lust) och impotens vanligt. Testikelatrofi förekommer. Gynekomasti förekommer.		
<b>Övrigt</b> Sömnbesvär förekommer. Humörförändringar och depression finns rapporterat.		
<b>Hudtoxicitet</b> Reaktioner vid injektionsstället (rodnad, svullnad, smärta) vanligt. Ökad svettning förekommer. Rodnad, klåda, utslag har rapporterats. Alopeci (hårfall) har rapporterats.		
<b>CNS påverkan</b> Yrsel och huvudvärk förekommer.		
<b>Endokrinologi</b> Hyperglykemi och diabetes förekommer. Metabola förändringar som minskad glukostolerans, viktförändringar, förhöjda kolesterolnivåer kan ge ökad risk för kardiovaskulära händelser som angina, hjärtinfarkt, stroke.		
<b>Övrigt</b> Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos.		
<b>Hjärttoxicitet</b> Förlängd QT-tid finns beskrivet för androgen deprivationsterapi. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.		