

# Läkemedel

## Denosumab Subkutan injektion

Basfakta

### Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Standarddos
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg
<b>Administreringsväg:</b>	Subkutan

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som subkutan injektion i singeldos en gång var 4:e vecka i låret, buken eller överarmen.

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Patienter som behandlas med Denosumab ska inte samtidigt behandlas med bisfosfonater.

### Biverkningar

<b>Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
<b>Endokrinologi</b> Hypokalcemi vanligt. Kalciumkontroll före och efter behandling. Nedsatt njurfunktion innebär ökad risk för hypokalcemi. Hypofosfatemi.		
<b>Övrigt</b> Osteonekros i käken (ONJ osteonecrosis of the jaw) förekommer, högre incidens ju längre behandling pågått. Före behandlingsstart rekommenderas tandundersökning och eventuella förebyggande åtgärder. Efter behandlingsstart bör invasiva tandingrepp undvikas.		
<b>Övrigt</b> Atypisk lårbensfraktur har rapporterats. Frakturen uppstår vanligtvis utan eller vid minimalt trauma, ibland bilateralt (röntga även kontralaterala sidan). Patienter bör rekommenderas att informera om nytillkomna eller ovanliga smärtor i höft, lår eller ljumske. Vid funnen fraktur skall övervägande av risk-nytta med fortsättning av behandling göras.		
<b>Övrigt</b> Muskuloskeletal smärta vanligt, inkluderande ledvärk, extremitetssmärta och ryggsmärta.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Diarré.		
<b>Andningsvägar</b> Andfåddhet vanligt.		