Läkemedel

Denosumab Subkutan injektion

ATC-kod: M05BX04

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Ges som subkutan injektion i singeldos en gång var 4:e vecka i låret, buken eller överarmen.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Patienter som behandlas med Denosumab ska inte samtidigt behandlas med bisfosfonater.

Handhavande:

Okonjugerad monoklonal antikropp, läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner ihttps://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Endokrinologi Hypokalcemi vanligt. Kalciumkontroll före och efter behandling. Nedsatt njurfunktion innebär ökad risk för hypokalcemi. Hypofosfatemi.		
Övrigt Osteonekros i käken (ONJ osteonecrosis of the jaw) förekommer, högre incidens ju längre behandling pågått. Före behandlingsstart rekommenderas tandundersökning och eventuella förebyggande åtgärder. Efter behandlingsstart bör invasiva tandingrepp undvikas.		
Övrigt Atypisk lårbensfraktur har rapporterats. Frakturen uppstår vanligtvis utan eller vid minimalt trauma, ibland bilateralt (röntga även kontralaterala sidan). Patienter bör rekommenderas att informera om nytillkomna eller ovanliga smärtor i höft, lår eller ljumske. Vid funnen fraktur skall övervägande av risk-nytta med fortsättning av behandling göras.		
Övrigt Muskuloskeletal smärta vanligt, inkluderande ledvärk, extremitetssmärta och ryggsmärta.		
Gastrointestinal påverkan Diarré.		
Andningsvägar Andfåddhet vanligt.		

Versionsförändringar

Version 1.1
Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.