

Läkemedel

Denosumab Subkutan injektion

ATC-kod: M05BX04

Basfakta

Doseringsaspekter

| | |
|---------------------|-------------|
| Beräkningssätt: | Standarddos |
| Enhet för grunddos: | mg |
| Administreringsväg: | Subkutan |

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som subkutan injektion i singeldos en gång var 4:e vecka i låret, buken eller överarmen.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Patienter som behandlas med Denosumab ska inte samtidigt behandlas med bisfosfonater.

Handhavande:

Okonjugerad monoklonal antikropp, läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|--|---|
| Endokrinologi Hypokalcemi vanligt. Hypofosfatemi. | Kalciumkontroll före och efter behandling. | Nedsatt njurfunktion innebär ökad risk för hypokalcemi. |
| Övrigt Osteonekros i käken (ONJ osteonecrosis of the jaw) förekommer, högre incidens ju längre behandling pågått. Före behandlingsstart rekommenderas tandundersökning och eventuella förebyggande åtgärder. Efter behandlingsstart bör invasiva tandingrepp undvikas. | | |
| Övrigt Atypisk lårbensfraktur har rapporterats. Frakturen uppstår vanligtvis utan eller vid minimalt trauma, ibland bilateralt (röntga även kontralaterala sidan). Patienter bör rekommenderas att informera om nyttillkomna eller ovanliga smärtor i höft, lår eller ljumske. Vid funnen fraktur skall övervägande av risk-nytta med fortsättning av behandling göras. | | |
| Övrigt Muskuloskeletal smärta vanligt, inkluderande ledvärk, extremitetssmärta och ryggsmärta. | | |
| Gastrointestinal påverkan Diarré. | | |
| Andningsvägar Andfåddhet vanligt. | | |

Versionsförändringar

Version 1.1

Lagt till handhavandeinfo.

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.