

Läkemedel

Dexametason Peroral lösning

ATC-kod: H02AB02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid i plasma 3,5 - 4,5 timmar, halveringstid för antiinflammatorisk effekt ca 36-54 timmar (FASS).

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

Se ePed-blad: <https://eped.se/backup/eped/3268.pdf> eller
<https://eped.se/backup/eped/3373.pdf>

Beakta risk för hyperglykemi och glukosuri vid planering av kurer.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CNS påverkan		
Upprymdhet, sömnsvårighet förekommer. Även irritabilitet, deprimerade och labila sinnestämningar förekommer.		
Endokrinologi		
Möjligt med kortvariga svängningar av blodsockernivåer hos diabetiker.		
Hudtoxicitet		
Psoriasis kan förvärras även av kortvarigt intag av höga doser kortikosteroider.		
Viss ökad risk för acne. Kan ge skör hud inklusive lättutlösta blåmärken, försämrad sårhäkning.		
Gastrointestinal påverkan		
Besvär med illamående och magsår förekommer.		