Läkemedel

# Dexametason Peroral tablett

ATC-kod: H02AB02

Basfakta

## Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Standarddos
**Enhet för grunddos:** mg
**Administreringsväg:** Peroral

## Anvisningar

**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**

Halveringstid i plasma 3,5 - 4,5 timmar, halveringstid för antiinflammatorisk effekt ca 36-54 timmar (FASS).

**Handhavande**:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

## Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

**Barnspecifik kommentar**

Beakta risk för hyperglykemi och glukosuri vid planering av kurer.

Se e-ped https://eped.se/backup/eped/3269_4.3.pdf

## Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---|---|
| **CNS påverkan** | | |
| Upprymdhet, sömnsvårighet förekommer. Även irritabilitet, deprimerade och labila sinnestämningar förekommer. | | |
| **Endokrinologi** | | |
| Möjligt med kortvariga svängningar av blodsockernivåer hos diabetiker. | | |
| **Hudtoxicitet** | | |
| Viss ökad risk för acne. Kan ge skör hud inklusive lättutlösta blåmärken, försämrad sårläkning. | | |
| Psoriasis kan förvärras även av kortvarigt intag av höga doser kortikosteroider. | | |
| **Gastrointestinal påverkan** | | |
| Besvär med illamående och magsår förekommer. | | |

## Versionsförändringar

**Version 1.6**
Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.5**
Barnspecifik kommentar: Lagt till länk till e-ped instruktion.

**Version 1.4**
granskad för barn, eped länk senare

**Version 1.3**
används för barn kryss

**Version 1.2**
synkroniserad ordning po lösning

**Version 1.1**
tillägg övrig anvisning läkemedel

**Version 1.0**
Basfaktan fastställdes.