

Antitumoralt läkemedel

Doxorubicin Liposomalt Intravenös infusion

BASFakta

Doseringsaspekter

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Beräkningssätt: | Kroppsyta |
| Enhet för grunddos: | mg/m ² |
| Administreringsväg: | Intravenös |

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerat preparat Caelyx.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Glukos 50 mg/ml

500 ml Glukos 50 mg/ml

Hållbarhet efter spädning
24 timmar

Förvaring
Kallt

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Röd lösning.

Dos <90 mg blanda i 250 ml.

Dos >90 mg blanda i 500 ml.

Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---------------|-------------------------------|
| Akut infusionsreaktion/anafylaxi | | Akutberedskap Antihistamin |
| Längre infusionstid vid första behandlingen eller vid reaktion, inte högre hastighet än 1 mg/minut. | | |
| Hjärttoxicitet | Hjärtfunktion | |
| Risk för hjärtsvikt. Risken ökar vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot hjärtat eller tidigare behandling med antracykliner eller antracenedioner. Utgångsvärde på vänsterkammarmfunktion bör finnas. Kumulativ livstidsdos över 450-550 mg/m ² skall inte överskridas utan ny vänsterkammarmfunktionsbedömning och bedömning av risk-nyttoförhållandet för patienten. | | |
| Hudtoxicitet | | |
| I studier har knappt hälften av patienterna rapporterat PPE, (palmoplantarerytrodysestesi / hand och fot syndrom) dvs smärtsamma, rödfläckiga hudutslag, oftast efter två eller tre behandlingscykler. Förbättring sker vanligtvis efter en till två veckor och i vissa fall kan det ta upp till 4 veckor eller längre för fullständig läkning. | | |
| Starkt vävnadsretande | | |
| Vid extravasering finns antidoten dexrazoxan (Savene) som kan användas. Infusioner ges under tre konsekutiva dagar. Första behandlingen ska startas inom sex timmar efter extravaseringen. | | |
| Hematologisk toxicitet | Blodvärden | Enligt lokala riktlinjer |
| Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos. | | |
| Slemhinnetoxicitet | | |
| Stomatit vanligt. | | |