

# Antitumoralt läkemedel

## Epirubicin Intravesikal instillation

BASFakta

### Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Standarddos
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg
<b>Administreringsväg:</b>	Intravesikal

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen bör kvarhållas i blåsan 1-2 timmar. Eventuellt kan patienten ändra kroppsläge var 15:e min.

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

För att förebygga utspädning av den verksamma substansen med urin, bör patienten instrueras att vara sparsam med dryck och peri- och postoperativa infusioner minimeras.

### Spädningsinformation

#### Spädningsanvisningar

Injektionsvätska med koncentrationen 2 mg/ml finns tillgänglig. Om lägre koncentration önskas används Natriumklorid 9 mg/ml som spädningsvätska.

Röd lösning.

**Hållbarhet efter spädning**  
72 timmar

**Förvaring**  
Rumstemperatur

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
-------------	----------	----------------------

#### Cystit

Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.

#### Starkt vävnadsretande

Observera att substansen är starkt vävnadsretande.