

Antitumoralt läkemedel

Epirubicin Intravesikal instillation

ATC-kod: L01DB03

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravesikal

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen bör kvarhållas i blåsan 1-2 timmar. Eventuellt kan patienten ändra kroppsläge var 15:e min.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

För att förebygga utspädning av den verksamma substansen med urin, bör patienten instrueras att vara sparsam med dryck och peri- och postoperativa infusioner minimeras.

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Injektionsvätska med koncentrationen 2 mg/ml finns tillgänglig. Om lägre koncentration önskas används Natriumklorid 9 mg/ml som spädningsvätska.

Röd lösning.

Hållbarhet efter spädning
72 timmar

Förvaring
Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
-------------	----------	----------------------

Cystit

Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.

Starkt vävnadsretande

Observera att substansen är starkt vävnadsretande.

Versionsförändringar

Version 1.1

Handhavande information tillagd.

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.