Antitumoralt läkemedel

# Estramustinnatriumfosfat Peroral kapsel

Basfakta

## Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Standarddos
**Enhet för grunddos:** mg
**Administreringsväg:** Peroral

## Anvisningar

**Anvisningar för läkemedelsadministration**
Samtidigt intag av mjölkprodukter ska undvikas.

**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**
**Handhavande:**

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf

## Biverkningar

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---|---|
| **Övrigt**<br>Gynekomasti mycket vanligt. Erektil dysfunktion har rapporterats | | |
| **Hematologisk toxicitet**<br>Anemi, leukopeni förekommer. Trombocytopeni har rapporterats.<br>Försiktighet vid tidigare känd trombosproblematik (venös trombos, tromboflebit) då östrogenbehandling vid prostatacancer är associerad med ökad risk för trombos. | | |
| **Gastrointestinal påverkan**<br>Illamående, kräkningar och diarré vanligt. | | |
| **Levertoxicitet**<br>Förhöjda levervärden vanligt. Följ levervärden regelbundet. | | |
| **Hjärttoxicitet**<br>Förhöjt blodtryck har rapporterats, kontroll av blodtryck ska ske regelbundet.<br>Försiktighet vid känd hjärt och kärlsjukdom, då östrogenbehandling vid prostatacancer är associerad med ökad risk för trombos och myocardischemi. Rapporter finns om ökad ödemproblematik och hjärtsvikt. | | |
| **Endokrinologi**<br>Glukostolerans kan minska, varför glukoskontroller bör ske noggrant hos diabetespatienter.<br>Metabolism av kalcium och fosfor kan påverkas, varför försiktighet vid känd hyperkalcemi eller njursvikt. | | |
| **Immunologisk reaktion**<br>Allergiska reaktioner inklusiva angioödem har rapporterats. Enligt SPC har flera av dessa fall haft samtidig behandling med ACE-hämmare. | | |
| **Graviditetsvarning**<br>Mutagena egenskaper. Män som behandlas med estramustin bör vidta antikonceptionella åtgärder om partner är fertil kvinna. | | |
| **Interaktionsbenägen substans**<br>Mjölkprodukter kan minska absorptionen av estramustin, då estramustin bildar olösliga salter med flervärda metalljoner.<br>Samtidig administrering av estramustin och ACE-hämmare kan öka risk för angioödem. | | |

## Versionsförändringar

**Version 1.1**
Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.0**
Basfaktan fastställdes.