

Antitumoralt läkemedel

Fludarabin Per oral tablett

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Per oral

Spädningsinformation

Hållbarhet efter spädning	Förvaring
NA NA	NA

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CNS påverkan Vid administrering i höga doser har man sett allvarliga neurologiska effekter.	Monitorering	
Immunologisk reaktion Transfusionsassocierad graft versus host sjukdom har observerats efter transfusion av obestrålat blod. En hög frekvens av dödsfall som följd av denna sjukdom har rapporterats.	Monitorering Blodvärden	Bestrålade blodprodukter
Tumörlyssyndrom Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lyses av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.	Urat	Allopurinol Hydrering
Infektionsrisk Risk för infektioner, lunginflammation. Svåra opportunistiska infektion har inträffat.	Monitorering	
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer