

Läkemedel

Fosaprepitant Intravenös infusion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Den rekommenderade dosen 150 mg administreras som infusion under 20-30 minuter på Dag 1 och inleds cirka 30 minuter innan cytostatikabehandling.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

150 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Fosaprepitant 150 mg löses med 5 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Tillsätt NaCl längs injektionsflaskans inre sidvägg, snurra försiktigt för att undvika skumbildning.

Tag en inf påse med 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Dra ur 105 ml ur påsen, kvar blir 145 ml. Tillsätt allt innehåll från flaskan med fosaprepitant, vänd varsamt några gånger. Styrkan blir 1 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning

12 timmar
24 timmar

Förvaring

Rumstemperatur
Kallt

Biverkningar

Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

Interaktionsbenägen substans

Metaboliseras i huvudsak via CYP3A4. Försiktighet om patienten står på warfarin, INR-värdena måste kontrolleras noga. Dos för kortikosteroid, se FASS.

Versionsförändringar

Version 1.0

Basfaktan fastställdes.