

# Antitumoralt läkemedel

## Fulvestrant Intramuskulär injektion

Basfakta

### Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intramuskulär

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Fulvestrant ska administreras som två efter varandra följande 5 ml injektioner genom långsam intramuskulär injektion (1-2 minuter/injektion), en i varje skinka (glutealområdet).

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>		
Vanligt med överkänslighetsreaktioner som urtikaria och angioödem. Anafylaxi ovanligt.		
<b>Hematologisk toxicitet</b>		
Påverkan blodbild finns. Trombocytopeni förekommer, grad 4 ovanligt. Även annan påverkan förekommer, som anemi och leukopeni, grad >2 ovanligt.		
<b>Övrigt</b>		
Reaktioner vid injektionsställe vanligt (smärta, blödning, blåmärke, neuralgi). Hudutslag vanligt. Kraftlöshet / fatigue vanligt. Ledsmärta och muskuloskeletal smärta vanligt, oftast grad 1-2. Ryggvärk och huvudvärk, förekommer. Blodvallning vanligt.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Illamående vanligt. Kräkning och diarré förekommer. Nedsatt aptit förekommer.		
<b>Levertoxicitet</b>		
Förhöjda levervärden vanligt. Leversvikt omnämns som rapporterade efter studier gjorda.		
<b>Tromboembolism</b>		
Venös thromboembolism förekommer.		
<b>Övrigt</b>		
Vaginal blödning förekommer. Vaginal flytning rapporterad. Urinvägsinfektioner förekommer		
<b>Graviditetsvarning</b>		
Patienter som kan bli gravida skall använda effektivt preventivmedel under behandlingen och i 2 år efter behandlingen avslutats.		