

Antitumoralt läkemedel

Gefitinib Per oral tablett

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Per oral
Dosering i förh. måltid:	Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tas vid samma tid varje dag.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hudtoxicitet Hudbesvär mycket vanligt. Utslag, klåda, acne och nagelproblem (exempelvis paronyki/nagelbandsinfektion). Överväg behandling med tetracyclin och informera patient om behov av mjukgörande kräm.	Biverkningskontroll	Mjukgörande hudkräm
Andningsvägar Interstitiell lungsjukdom förekommer. Plötsliga nya symtom med andnöd, hosta och feber skall utredas. Uppehåll med behandling vid utredning, avsluta vid konstaterad diagnos.	Monitorering	
Gastrointestinal påverkan Diarré vanligt, oftast mild, men kan bli uttalad. Överväg behandling med loperamid och hydrering. Illamående, nedsatt aptit, kräkning och förstoppning förekommer också.		Loperamid Hydrering
Interaktionsbenägen substans Metaboliseras i huvudsak via CYP3A4. Samtidig administrering av CYP3A4-inducerare kan minska effekten av behandlingen och ska undvikas (exempelvis: fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbiturater och naturläkemedel innehållande johannesört - Hypericum perforatum). Andra interaktioner finns, se FASS.		
Övrigt Läkemedel som varaktigt höjer pH i magsäcken, t.ex. H2-blockerare och protonpumpshämmare, kan minska effekten av Gefitinib och bör undvikas.		